Radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozók kiégési szintje Magyarországon

Sipos Dávid^{1, 2, 3} ■ Varga Veronika¹ ■ Pandur Attila András¹
Kedves András^{2, 3} ■ Petőné Csima Melinda dr.¹ ■ Cseh Szabolcs¹
Betlehem József dr.¹ ■ Moizs Mariann dr.⁴ ■ Repa Imre dr.^{1, 3}
Kovács Árpád dr.^{1, 2, 3}

¹Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Doktori Iskola, Pécs

²Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Diagnosztikai Intézet, Pécs

³Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Dr. Baka József Diagnosztikai,
Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ, Kaposvár

⁴Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

Bevezetés: A segítő szakmákban dolgozó szakembereket veszélyeztető kiégésnek széles körű negatív hatásai lehetnek, ami a betegellátás minőségét és az egészségügyi rendszer hatékonyságát is befolyásolhatja.

Célkitűzés: A kutatás célja volt feltárni, hogy a magyarországi radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozókat milyen mértékben veszélyezteti a kiégés.

Módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti, leíró kutatás keretében az adatgyűjtésre 2018. június–szeptember intervallumban online felületen megosztott kérdőív segítségével, radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozók körében került sor egyszerű, nem véletlenszerű mintavétel alkalmazásával, anonim módon. A saját szerkesztésű kérdőív a szociodemográfiai és a munkavégzés jellegével kapcsolatos jellemzők mellett a Maslach Burnout Inventory (MBI) nemzetközileg validált kérdőívet is tartalmazta.

Eredmények: Az adatok tisztítását követően összesen 404 fő válaszait vontuk be a statisztikai elemzésbe. A többségében megyei kórházakban alkalmazott szakdolgozók átlagosan 18,3 éve (SD 13,7) dolgoznak az egészségügyi ellátórendszerben. A kiégésnek a deperszonalizáció és emocionális kimerülés dimenziójában a minta enyhén emelkedett értékű kiégést mutat. Az iskolai végzettség, az életkor és az egészségügyben eltöltött évek száma szignifikánsan befolyásolta mindhárom, kiégéssel kapcsolatos dimenziót ($p \leq 0,05$). A 31–35 éves korcsoport és a 16–20 éve a pályán lévő válaszadók tekinthetők a legvesélyeztetettebb csoportnak a kiégés mindhárom dimenziójában. Az MSc-végzettséggel rendelkezők emocionális kimerülési értéke szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult társaikéhoz viszonyítva.

Következtetés: A deperszonalizáció és az emocionális kimerülés emelkedett értéke jelző értékkel bírhat a munkáltatók számára. A kapott eredmények a nemzetközi szakirodalomban leírtakkal jól korrelálnak.

Orv Hetil. 2019; 160(27): 1070–1077.

Kulcsszavak: radiográfus, radiológia, kiégés, Maslach Kiégés Leltár

Burnout level among radiology department workers in Hungary

Introduction: Burnout can have a wide negative impact on the quality and the effectiveness of the health care system. The aim of our research was to assess the burnout level of the radiology department workers in Hungary.

Method: Our quantitative, cross-sectional, descriptive data collection lasted from June to September 2018 using an online questionnaire. Simple, non-random sampling was carried out among radiology department workers in Hungary. In addition to our self-made questionnaire which included socio-demographic and work-related questions, an internationally validated Maslach Burnout Inventory questionnaire was sent out.

Results: After data cleaning, a total number of 404 ($n = 404$) respondents were included in the statistical analysis. The majority of the respondents works in county hospital, the average year spent in the healthcare system was 18.3 (SD 13.7). The sample's values at the depersonalization and emotional exhaustion dimension were slightly elevated in contrast to the average values. Educational level, age and years spent in the healthcare system had a significant influence on all the three dimensions of burnout ($p \leq 0.05$). The group of workers being 31–35 years old and the group

of those who spent 16–20 years in the healthcare system are considered to be the most compromised groups in all the three dimensions of burnout. Respondents with master degree had significantly lower emotional exhaustion values than their colleagues.

Conclusion: The increased value of the depersonalization and the emotional exhaustion can be an indicator for employers. Our results are similar like described in the international literature.

Keywords: radiographer, radiology, burnout, Maslach Burnout Inventory

Sipos D, Varga V, Pandur AA, Kedves A, Petőné Csima M, Cseh Sz, Betlehem J, Moizs M, Repa I, Kovács Á. [Burn-out level among radiology department workers in Hungary]. *Orv Hetil.* 2019; 160(27): 1070–1077.

(Beérkezett: 2019. február 19.; elfogadva: 2019. március 9.)

Rövidítések

AI = (artificial intelligence) mesterséges intelligencia; ANOVA = (analysis of variance) varianciaanalízis; CT = (computed tomography) komputertomográfia; DSA = digitális szubtrakciós angiográfia; MBI = (Maslach Burnout Inventory) Maslach Kieégés Leltár; MR = (magnetic resonance) mágneses rezonancia; MRAE = Magyar Radiográfusok Egyesülete; MSc = (magister scientiæ) mesterképzés; PET = (positron-emission tomography) pozitronemissziós tomográfia; Rtg = röntgen; SD = standard deviáció; SPSS = (statistical package for the social sciences) statisztikai csomag a társadalomtudományok számára; UH = ultrahangvizsgálat

A munkahelyi kieégés (burnout) gyakran fordul elő az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók körében, mely jelenség hátterében húzódó okok felderítésére számos kutatás irányult a közelmúltban. Az egészségügyi szakemberek munkájuk során számos pszichológiai, fizikai és szociális problémával küzdő beteggel kerülnek kapcsolatba, ami potenciálisan több stresszt idézhet elő [1]. A munkahelyi stressz Maslach és Jackson szerint emocionális kimerültséghez, elszemélytelenedéshez vezethet, ami a személyes hatékonyság alacsony szintjével együtt kieégést (burnout) okozhat [2].

A burnout negatív hatással lehet az egyénre, a gondozásra szoruló betegekre, a munkatársakkal való kapcsolatokra és a hatékony egészségügyi ellátásra [3].

Mivel a burnout folytonos, egymással kapcsolatban álló ciklusokból álló folyamat, melyet stresszorok váltanak ki, amennyiben a dolgozó stresszkezelő módszerei kudarcot vallanak, kialakul a krónikus fizikai és érzelmi kimerülés állapota [4].

A folyamatosan megújuló technológia forradalmasította a radiológiai ellátást, ezzel együtt az egészségügyi ellátás során szerepe egyre hangsúlyosabbá vált. A diagnosztika területén bekövetkező fejlődés felgyorsította az egységnyi idő alatt elvégezhető felvételek számát, ami nagyobb munkahelyi megterheléshez vezetett. A munkavégzés során tapasztalt ingerek hozzájárulhatnak a kieégés mértékének emelkedéséhez.

Számos munkahelyi sajátosság járulhat hozzá a kieégéshez, ilyen sajátosság például az adminisztratív feladatok elvégzése, a hosszú munkaidő vagy az orvosírnoki fel-

adatkör ellátása. A radiológiai asszisztensek szakmai sajátosságához sorolható az autonómiának és az előrelépésnek a hiánya, ami hosszú távon nagyban hozzájárulhat az egyén kieégési szintjéhez [5]. A kórházban dolgozó kollégák és a betegek részéről tapasztalt megbecsülés hiánya, valamint a nem megfelelő javadalmazás mind felelőssé tehető a jelenség kialakulásáért. Nem szabad megfedkedezni a hivatással járó nagyfokú érzelmi involválódásról sem, hiszen a radiológiai asszisztensek a daganatos betegek és a különböző traumás elváltozások kapcsán kórházi ellátást igénylők ellátásában is részt vesznek, mely betegcsoportokban gyakran a legfiatalabb korosztály is érintett [6].

A kieégés veszélye az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó szakembereket fokozottan fenyegeti, mely jelenség mögött az irodalmi adatok szerint a következő stresszorok mutatkoznak fő prediktorként: nem, életkor, munkában eltöltött idő, másodállás, munkakör, munkahelyi elégedettség és családi összetétel. A kapcsolódó szakirodalom a nők körében tapasztalt emelkedett, kieégéssel kapcsolatos értékekről számol be, aminek hátterében a nők alacsonyabb stressztűrő képessége áll. Emelkedett értéket mutattak az egyedülálló egészségügyi dolgozók adatai is, továbbá összefüggés mutatkozott az egészségügyi ellátásban eltöltött idő és a kieégés szintje között is [7, 8].

Célkitűzés

Figyelembe véve a stressz és a kieégés lehetséges negatív következményeit, a radiológiai osztályok környezetében a foglalkozási kieégés prevalenciájára vonatkozó további információkra van szükség. Eredményeinket összevetve a korábban publikált, a radiográfia területén dolgozó szakemberek kieégését feltáró vizsgálatokkal, szakirodalmi kutatásokat végeztünk a PubMed-en a „radiology”, „burnout”, „Maslach”, „radiography/radiographer” kulcsszavak alkalmazásával.

Jelenlegi ismereteink alapján Magyarországon a radiológiai osztályokon dolgozó szakemberek foglalkozási kieégéséről a szabványosított és validált Maslach Burnout Inventory (MBI) kérdőív segítségével még nem történt állapotfelmérés. Kutatásunk célja az említett szakdolgo-

zói kör kiegészi szintjének felmérése volt, továbbá a jelen-ség mögött húzódo munkahelyi sajátosságokkal kapcsola-tban álló okok elemzése.

Módszer

Kutatásunk típusát tekintve keresztmetszeti, leíró kutató-s, mely célirányos, nem véletlenszerű mintavétellel va-lósult meg. A radiológiai osztályon dolgozó szakdolgo-zók kiegészi szintjének vizsgálatára irányuló felmérés a Magyar Radiológusok Egyesületének (MRAE) jóváha-gyásával és támogatásával valósult meg. Az egyesület rendszerében regisztrált közel 3000, radiológiai osztá-lyon dolgozó szakdolgozó e-mail-címeit használtuk az online kérdőívek célba juttatásához. A kérdőív az e-mail-címeiken kívül a legismertebb közösségi oldal dedikált magyar szakmacsoportjaiban 2018 júniusától 2018 szeptemberéig volt elérhető.

Az alapvető szociodemográfiai adatokon kívül azono-sításra alkalmas adatokat nem gyűjtöttünk, a szociode-mográfiai jellemzők mellett a kérdőív számos, munka-végzéssel kapcsolatos kérdést tartalmazott. A radiográfia területén dolgozó szakdolgozók kiegészének felmérésére a nemzetközileg validált Maslach Kiegész Leltárt alkalmaztuk. A felmérés érzékeny és önreflexiós jellege miatt a kutatás során fokozottan ügyeltünk a válaszadók ano-nimitására.

Statistikai analízis

Az adatfeldolgozás az SPSS 24.0 verziójú statisztikai szoftver (IBM Corporation, Armonk, NY, Amerikai Egyesült Államok [USA]) és a Microsoft Excel 2010-es verzió (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) segítségével valósult meg. A statisztikai elemekre tekin-tettel leíró statisztikát, egymintás t-próbát, varianciaana-lízist (ANOVA), Kruskal–Wallis-tesztet alkalmaztunk 95%-os valószínűségi tartományban ($p \leq 0,05$).

Maslach Burnout Inventory – Maslach Kiegész Leltár (MBI)

A 22 tételből álló kérdőív a deperszonalizáció, az érzelmi kimerülés és a személyes hatékonyság dimenziókra vo-natkozik. Minden egyes tételnél 7 fokozatú Likert-ská-lán jelölhetette a válaszadó, hogy az adott válasz mennyire jellemző saját magára nézve. A skálaértékek a következők voltak: 1) soha, 2) évente többször, 3) havonta egyszer, 4) havonta többször, 5) hetente egyszer, 6) hetente többször, 7) minden nap [9–12].

A személyes hatékonyságra vonatkozó állítások esetén az alacsony, míg az érzelmi kimerültségre, valamint a de-perszonalizációra vonatkozó állítások esetén a magas pontszám jelezhet különböző mértékű kiegész.

A rövidített MBI-hez kapcsolódó kérdések mellett szociodemográfiai kérdéseket tartalmazó saját szerkesz-

tésű kérdéssort is csatoltunk, mely javarészt munkahelyi sajátosságokkal, családi összetétellel, végzettséghez köt-hető szakmai elhivatottsággal kapcsolatos kérdéseket tar-talmazott.

Eredmények

Az online kérdőívet összesen 404 ($n = 404$) fő töltötte ki, akik közül 189 ($n = 189$) a Magyar Radiológusok Egyesületének tagja volt. A válaszadók 28%-a ($n = 113$) megyei kórházban dolgozik. Átlagéletkoruk a kérdőív kitöltésének időpontjában 40,08 év volt ($SD = 12,181$; range 22–70). Nemi megoszlás tekintetében a női vá-laszadók voltak többségben (férfi $n = 57$, nő $n = 347$). A válaszadók több mint fele ($n = 256$) házastársával/élet-társával és gyermekével él egy háztartásban, s viszonylag magas az egyedülállók aránya is ($n = 110$). Iskolai vég-zettséget tekintve elmondható, hogy 10,6%-uk ($n = 43$) rendelkezett középiskolai végzettséggel, 30,4%-uk ($n = 123$) felsőfokú szakképesítéssel, 56,2%-uk ($n = 227$) főiskolai vagy felsőfokú alapképzésben szerzett oklevél-lel, továbbá a megkérdezettek 2,7%-a ($n = 11$) rendelke-zett egyetemi diplomával a kérdőív kitöltésének idő-pontjában. A szakmai közérzetre, ezzel együtt a kiegészre vonatkozó kutatások rámutatnak arra az összefüggésre, hogy a munkavégzésért járó jövedelem meghatározza a szakmai közérzetet, ezzel együtt befolyásolhatja a kiegész szintjét [10, 13]. A kutatási eszköz összeállítása során ezért fontosnak tartottuk szerepeltetni az anyagi hely-zettel kapcsolatos kérdéseket is. A válaszadók 56,4%-a ($n = 228$) megél a fizetéséből, de keveset tud félretenni, 8,4%-uk ($n = 34$) pedig úgy érzi, jövedelme arra sem elég, hogy megéljen belőle (1. táblázat).

A válaszadók 22,5%-a ($n = 91$) rendelkezik másodál-lással, mely közel 90%-ban az egészségügyhöz, orvosi ké-palkotáshoz köthető (2. táblázat). A munkavállalók 65,3%-a ($n = 264$) heti 40 és 50 óra között dolgozik, a minta közel egyharmada (28,5%; $n = 115$) kevesebb mint 40 órát. Az ügyletek számát tekintve a minta közel fele (49,3%; $n = 199$) egy ügyeletet sem vállal, 21,5%-uk ($n = 87$) legfeljebb három, 10,5%-uk ($n = 43$) legfeljebb ötöt, míg a minta 18,6%-a ($n = 75$) több mint öt ügyele-t vállal havonta.

A kiegész szempontjából fontos kérdés, hogy a magyar-orosz radiológiai vonatkozású munkahelyeken dolgozó szakdolgozók milyen módon próbálják bővíteni szakmai ismereteiket. A különböző képzéseken való részvétel nö-veli a szakmai kompetenciát, ami pozitívan hathat a sze-mélyes hatékonyságra, csökkentve ezáltal a kiegész mérté-két. A válaszadók túlnyomó többsége konferenciák keretén belül mélyíti tudását ($n = 210$), azonban a főis-kolai/egyetemi képzésben részt vevők száma sem elha-nyagolandó ($n = 51$). Az eredmények ugyanakkor felhív-ják a figyelmet arra, hogy a válaszadók nem tartják fontosnak a legmodernebb képző technikák tanul-mányozását, továbbá egyetlen válaszadó sem végez a szakterületéhez kapcsolódó kutatásokat (2. táblázat).

1. táblázat | A válaszadók (n = 404) jellemzése nem, családi állapot, iskolai végzettség, jelenlegi anyagi helyzet szerint

Nem	n (%)
Férfi	57 (14,1)
Nő	347 (85,9)
Családi állapot	
Házastársával/élettársával él	156 (38,6)
Házastársával/élettársával és gyerekével él	100 (24,8)
Egyedülálló	110 (27,2)
Egyéb családtagjával él	28 (6,9)
Egyéb személlyel él	6 (1,5)
Özvegy	4 (1)
Legmagasabb iskolai végzettség	
Középiskolai végzettség	43 (10,6)
Felsőfokú szakképzés	123 (30,4)
Főiskolai, vagy felsőfokú alapképzés (Ba/BSc)	227 (56,2)
Egyetemi végzettség (Ma/MSc)	11 (2,7)
Anyagi helyzet	
Nagyon jól megél, félre is tud tenni	17 (4,2)
Megél, keveset tud félretenni	228 (56,4)
Éppen megél, nem tud félretenni	125 (30,9)
Nem elég a megélhetésre	31 (7,7)
Rendszeres megélhetési problémái vannak	3 (0,7)

Ba/BSc = alapképzés (3 év); Ma/MSc = mesterképzés (alapképzés után 2 év)

A válaszadók 30%-a érzi azt, hogy korlátozottak a lehetőségei a szakmai munka végzése során, és szakmájuk több lehetőséget rejt magában. A válaszadók 46,5%-a (n = 188) gondolja úgy, hogy a szakmában dolgozó radiológiai asszisztens kellő végzettséggel, kellő tapasztalattal képes lenne bizonyos orvosi feladatok ellátására (például: törések megállapítása Rtg-felvételeken, szonográfusi tevékenység). A válaszadók 79,5%-a (n = 321) teljes mértékben ajánlaná szakmáját a fiatal, pályaválasztás előtt álló hallgatóknak. Saját szerkesztésű kérdőívünk során nyitott kérdéseket tettünk fel a válaszadóknak azzal kapcsolatban, hogy miben látják szakmájuk gyengeségét, erősségét, továbbá mit változtatnának szakmájukban, ha lenne rá lehetőségük. A kérdéskör megfogalmazásakor nem foglalmaztunk meg előre felkínált válaszlehetőségeket, a válaszadók személyes gondolataiknak, véleményüknek adhattak hangot.

A válaszadók körében az emocionális kimerülés alskálájának átlagpontszáma 34,3 (SD = 12,9), a deperszonalizációs alskáláé 12,8 (SD = 6,6), míg a személyes hatékonysági alskála átlagpontszáma 41,0 (SD = 8,7) körül alakult. Az orvosok és ápolók körében végzett Maslach-kiégés kérdőív eredményeivel összevetve, a radiográfia területén dolgozó szakemberek kiégésével kapcsolatban

2. táblázat | Válaszadóink munkahelyi jellege, modalitásbeli megoszlásának aránya, a szakmai kompetencia emelése érdekében tett lépések, másodállás megléte és vonatkozása

A munkahely jellege	n
Egyetemi klinika	75
Megyei kórház	113
Vidéki kórház	49
Magánegészségügy	64
Járóbeteg-szakrendelő	45
Országos intézet	58
Modalitás	
DSA	21
Rtg	209
UH	118
CT	81
MR	39
CT/MR	63
PET/Nukleáris medicina	12
Sugarárterápia	72
A szakmai kompetencia emelése	
Egyetemi/főiskolai képzésben vesz részt	51
Képzőképző tanfolyamokon vesz részt	159
Szakmai folyóiratot olvas	135
Konferenciákon vesz részt	210
Konferenciákon vesz részt, előadást is tart	89
Tanulmányozza a legmodernebb technikákat	0
Kutatásokat végez	0
Másodállás jelenléte	
Igen	91
Nem	313
A másodállás jellege	
Orvosi képzőképzés	45
Egészségügy	27
Egyéb	11

CT = komputertomográfia; CT/MR = komputertomográfia/mágneses rezonancia; DSA = digitális szubtrakciós angiográfia; MR = mágneses rezonancia; PET = pozitronemissziós tomográfia; Rtg = röntgen; UH = ultrahang

3. táblázat | A Maslach Burnout Inventory (MBI) kérdőív átlageredményei, viszonyítva a saját kutatásunk eredményeihez az emocionális kimerülés, a deperszonalizáció és a személyes hatékonyság dimenziójában

	MBI-átlag [9]	Saját felmérés	Cronbach-alfa
Emocionális kimerülés	22,0 ± 10,8	34,3 ± 12,9	0,912
Deperszonalizáció	8,7 ± 5,9	12,8 ± 6,6	0,747
Személyes hatékonyság	34,6 ± 7,1	41,0 ± 8,7	0,812

az tapasztalható, hogy az emocionális kimerülés és a deperszonalizáció alskáláján mért értékek emelkedettebbek. A személyes hatékonyság dimenzióját vizsgálva a radiológia területén dolgozó szakemberek kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek. A személyes hatékonysági alskálán mért enyhén magasabb érték pozitívan értelmezendő (3. táblázat).

A középiskolai, felsőfokú, főiskolai végzettséggel rendelkező válaszadók emocionális kimerülési átlagértéke szignifikánsan magasabb értéket mutat az egyetemi végzettséggel rendelkező válaszadókéhoz képest ($p = 0,001$). A deperszonalizáció dimenziójában az egyetemi végzettséggel rendelkező válaszadók értéke bizonyult emelkedettebbnek a náluk alacsonyabb végzettséggel rendelkezőkhöz képest ($p = 0,001$). A munkavégzés során észlelt személyes hatékonyság átlagértékeit tekintve az iskolai végzettségtől függetlenül mindegyik kategória átlagértéke magasabb, mint a MBI során leírtak, azonban a mesterdiplomával rendelkező válaszadók értéke kiemelkedő az említett dimenzióban ($p = 0,008$).

A mintánkban szereplő szakdolgozókat korcsoportok szerint kategorizáltuk. Az emocionális kimerülés és a deperszonalizáció dimenziójában a 31–35 éves válaszadók értékei meghaladják a többi korcsoportéit, az életkor előrehaladtával azonban mind az emocionális kimerülés, mind a deperszonalizáció átlagértéke mérséklődik ($p = 0,001$; $p = 0,007$). A személyes hatékonyság dimenziójában a 60 évnél idősebb válaszadók élik meg a legjobban a mindennapok tevékenységeit ($p = 0,001$).

Az egészségügyben eltöltött évekre tekintettel az emocionális kimerülés dimenziójában kiugró értéket figyelhetünk meg a 16–20 éve a szakmában dolgozó válaszadóknál. Az említett érték az évek során mérséklődő tendenciát mutat a kutatásba bevont szakdolgozók körében ($p = 0,011$). A deperszonalizáció dimenziójában egy szinte stagnáló emelkedett értéket fedezhetünk fel, mely érték szintén csökkenő tendenciát mutat az egészségügyi ellátásban eltöltött évek során ($p = 0,008$). A személyes hatékonyság vonatkozásában kiugró és alacsonyabb értékek váltakozását figyelhetjük meg ($p = 0,002$) (4. táblázat).

Megbeszélés

Számos nemzetközi kutatás irányult a radiológia területén dolgozó szakemberek körében megfigyelhető kiégésre, mely jelenség kialakulása mögött az egyik fő okként az ügyeletek magas számát nevezték meg [13–16]. Magyarországon ez idáig a kutatók kevésbé helyezték figyelmük fókuszába a radiológiai osztályokon dolgozó személyzetet. Kutatásunk ennek értelmében hiánypótlónak bizonyul, mely a magyar radiológiai osztályon dolgozó 'nondoktorok' kiegészi szintjéről kíván beszámolni. Eredményeink alapján a kutatásba bevont szakdolgozók kiegészi szintje a deperszonalizáció és az emocionális kimerültség dimenzióját tekintve magasabb értéket mutat, mint a korábbi, nemzetközi tanulmányokban publikált

4. táblázat | Az iskolai végzettség, az életkorcsoportok, az egészségügyben eltöltött évek és a kiégés kapcsolata

Változó	n (%)	Emocionális kimerülés (átlag ± SD)	Deperszonalizáció (átlag ± SD)	Személyes hatékonyság (átlag ± SD)
Iskolai végzettség				
Középiskolai végzettség	43 (10,6)	31,7 ± 12,8	12,4 ± 7,1	43,3 ± 7,1
Felsőfokú szakképzés	123 (30,4)	32,1 ± 13,1	10,7 ± 5,9	41,9 ± 9,0
Ba/Bsc	227 (56,2)	36,3 ± 12,8	13,8 ± 6,6	39,9 ± 8,7
MA/MSc	11 (2,7)	25,9 ± 9,4	17,7 ± 5,4	45,9 ± 8,2
		$p = 0,001^{**}$	$p = 0,001^{**}$	$p = 0,008^{**}$
Korcsoportok				
20–25 év	40 (9,9)	33,3 ± 12,1	11,5 ± 6,1	40,0 ± 9,2
26–30 év	105 (26,0)	36,1 ± 13,1	14,7 ± 5,9	41,1 ± 6,9
31–35 év	27 (6,7)	40,4 ± 9,9	17,1 ± 6,6	37,3 ± 7,8
36–40 év	36 (8,9)	33,0 ± 10,9	13,1 ± 6,4	39,0 ± 7,4
41–45 év	36 (8,9)	34,3 ± 13,4	12,0 ± 7,9	42,4 ± 8,9
46–50 év	65 (16,1)	34,7 ± 11,9	12,0 ± 7,3	40,5 ± 9,8
51–55 év	47 (11,6)	32,8 ± 14,8	10,3 ± 4,8	43,0 ± 10,0
56–60 év	31 (7,7)	32,7 ± 15,9	11,6 ± 5,7	39,6 ± 9,7
60 évnél idősebb	17 (4,2)	22,9 ± 5,9	9,4 ± 6,2	48,5 ± 4,2
		$p = 0,001^{**}$	$p = 0,007^{**}$	$p = 0,001^{**}$
Az egészségügyben eltöltött évek				
1–5 év	114 (28,2)	36,5 ± 11,8	14,3 ± 6,9	41,3 ± 7,5
6–10 év	56 (13,9)	33,3 ± 13,2	13,8 ± 5,0	40,0 ± 6,7
11–15 év	26 (6,4)	32,6 ± 12,2	13,1 ± 6,2	33,7 ± 8,1
16–20 év	26 (6,4)	39,4 ± 10,8	14,9 ± 7,1	41,7 ± 6,7
21–25 év	37 (9,2)	35,3 ± 11,8	11,0 ± 7,2	44,4 ± 8,4
26–30 év	46 (11,4)	35,2 ± 13,7	12,3 ± 6,3	38,6 ± 10,1
31–35 év	53 (13,1)	31,2 ± 14,1	10,5 ± 6,5	41,4 ± 10,6
35 évnél több	46 (11,4)	29,5 ± 13,8	10,8 ± 6,0	44,0 ± 8,4
		$p = 0,011^{*}$	$p = 0,008^{**}$	$p = 0,002^{**}$

*ANOVA; ** Kruskal–Wallis statisztikai elemzés során kapott eredmények

ANOVA = varianciaanalízis; Ba/BSc = alapképzés, 3 év (régii főiskolai diploma); Ma/MSc = mesterképzés; SD = standard deviáció

értékek, a személyes hatékonyság szintje azonban nagyon kedvező tartományban mozog [17, 18].

Kutatásunk fényt próbált deríteni arra, hogy a radiográfia területén dolgozó szakemberek miben látják azokat az okokat, amelyek gyengítik a szakmájukat, egyúttal min változtatnának a szakmájukban. A válaszokat besorolásukat tekintve négy nagyobb csoportra lehetett bon-

tani. A válaszok alapján a munkavégzéssel járó adminisztrációs feladatok és a leletezés bizonyult terhesnek a szakdolgozók számára. A kliensek és az egészségügyi ellátórendszer más szakterületen dolgozó szakemberei részéről megtapasztalt alacsony megbecsülést, az alacsony bérezést és az előrelépés lehetőségének hiányát is nehezítették a válaszadók. Eredményeink alátámasztják az anyagi helyzetre vonatkozó frusztrációt: a minta 56,4%-a megél ugyan a fizetéséből és keveset tud félretenni, azonban 38,4% a válaszadók közül nem tud félretenni a havi fizetéséből. A válaszadók anyagi helyzete szignifikánsan befolyásolta a deperszonalizáció, az emocionális kimerülés és a személyes hatékonyság dimenzióját ($p < 0,05$). A munkavégzésért kapott jutalom és a feljebb lépési lehetőség hiányát egy korábbi kutatásunk során már vizsgáltuk. E két tényező döntő befolyást gyakorolt a minta migrációs és pályaelhagyási hajlamára, jelen tanulmányunk pedig igazolta, hogy a kiegészben is szerepet játszik [19].

Eredményeink alapján a minta közel 30%-a több potenciált érez szakmájában, amit az összes válaszadó további 46,6%-a egészít ki azzal, hogy a megfelelő szintű végzettséggel rendelkező szakdolgozó kellő tapasztalattal képes lenne bizonyos orvosi feladatok ellátására. A jelen eredményekből arra a következtetésre juthatunk, hogy a radiológiai osztályok egy bizonyos szakdolgozói rétege pozitívan értékelné egy esetleges kompetenciabővítést, mely potenciális kiutat jelenthetne a kiegészi szint redukálásában.

A gyakorlott radiológusok bevonása a magasabb kompetenciát igénylő radiológiai feladatokba nem új keletű. Dániában 2013-ban publikált, a sürgősségi kórképekkel kapcsolatos kutatás rámutatott arra, hogy a radiológusok 99%-ban alkottak korrekt diagnózist, míg a gyakorló radiológusok 94%-ban [20].

2012-ben Dublinban *Kelly és mtsai* szintén a sürgősségi kórképek között vizsgálta a fiatal radiológusok és a gyakorlott radiológusok leletezési képességét, mely kutatás eredményeül a radiológusok és a fiatal orvosok kollaborációja szignifikánsan magasabb diagnosztikai pontosságot mutatott [21].

Lockwood és mtsai (2015) Angliában vizsgálták az akkreditált posztgraduális koponya-CT-képzés eredményességét. A képzést elvégző radiológusok 600 leletet készítettek, s ennek során 99%-os szenzitivitás, 95%-os specificitás és 90%-os egyezséggyeztetési arány alakult ki [22]. Szintúgy *Lockwood* volt az, aki 2017-ben igazolta, hogy az orrmelléküregek- és arckoponya-CT-felvételek során a radiológusok 97,5% szenzitivitást, 93,6% specificitást és 95%-os pontosságot képesek elérni a dedikált posztgraduális képzés után, amivel megfelelnek a magas klinikai standardoknak [23].

Piper és mtsai 2018-ban koponya- és nyakgerinc-MR-felvételeken próbálták igazolni a radiológusok hatékonyságát. Eredményeik alapján 98,86% szenzitivitás, 98,08% specificitás és 88,37% egyezséggyeztetési arány mutatkozott, különös figyelemmel az astrocytoma, porc-

korong-protrusio, gerincvelő-kompresszió és csigolyatörés kórképeire [24].

A röntgen-, CT- és MR-képképzés mellett szonográfusi képességeket is vizsgáltak Svédországban. A *Stenman és mtsai* (2013) által publikált eredmények jó interobserver egyezséget mutattak a tapasztalt radiológusok és a radiológusok által felismert kórképek között, kiemelkedően az epehólyag és a máj elváltozásainál [25].

A radiológusok képességeit számos tanulmány alátámasztja, azonban szinte mindegyik az oktatás/dedikált posztgraduális képzés fontosságát helyezi a középpontba. A képzések elvégzésével a tapasztalt radiológusok képességei megfelelőnek bizonyulnának a klinikai kihívásoknak megfelelően. Nyugati országokban bevált példa, hogy a kellő tapasztalattal és végzettséggel rendelkező radiológusok továbbképzése során egyfajta licenszet kapnak egy adott régióban való magasabb, orvosi kompetenciák ellátására. Egy esetleges posztgraduális képzés szélesebb kompetenciát adna a vizsgált szakdolgozói körnek, feljebb lépési lehetőséggel szolgálna, ami pozitív hatást gyakorolna a kiegészre, a pályaelhagyásra és a migrációs hajlamra [19, 26, 27]. Az informatikai rendszerek folytonos megújulásával párhuzamosan a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) egyre nagyobb teret hódít az egészségügyben. A radiológia területén az AI ígéretes eredményeket tudhat magáénak, melyeket jelentős izgalom és kérdések öveznek. Könnyen elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia az egészségügybe való beolvadásával hatást gyakorol majd többek között a kiegész mértékére is [28].

A válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a szakdolgozóknak már megjelent az igény a saját kompetenciájuk bővítésének irányába, azonban az ehhez szükséges edukációs szint eléréséről sem szabad megfeledkezni. A válaszadók közül a minta alig több mint fele (56,2%) rendelkezett főiskolai szintű végzettséggel, és csupán 2,7% MSc-képesítéssel. A jelen, relatíve alacsony értékek hátterében az állhat, hogy a radiológusképzés főiskolai szintre emelése a 2000-es évek elejére tehető, időre van szüksége a szakmának, hogy kellő szintre fejlődhesen. A tudás magasabb szintre való emelése érdekében tett erőfeszítések sem kecsegtetők, a válaszadók közül 51 ($n = 51$) személy vesz részt főiskolai/egyetemi képzésben, azonban senki nem végez kutatásokat tudományos területén.

Az MSc-végzettséggel rendelkező radiológusoknak az emocionális kimerülés dimenziójában érzékelt értékek alacsonyabbnak bizonyulnak náluk alacsonyabb végzettséggel rendelkezőkénél. A jelen eredményt annak tudhatjuk be, hogy az egyetemi végzettséggel rendelkező válaszadók viszonylag kevés időt töltöttek el az egészségügyben, ezért reagálhatnak emocionálisan jobban, mint társaik. A másik ok, mely a jobb érzelmi eredmények mögött állhat, az, hogy tanulmányaik során a képzésben szélesebb körű ismeretekre tesznek szert az egészségügy és a viszonyulásmenedzsment terén, ezáltal jobban kezelik az érzelmi élethelyzeteket.

Ugyanezen csoportot vizsgálva a deperszonalizációs érték viszont szignifikánsan magasabbnak bizonyult a társakéhoz viszonyítva ($p = 0,001$). A feleletválaszolók kérdésekre elvétve ugyan, de érkeztek válaszok, melyek a szakmai féltékenységet, a végzettségből adódó konfliktushelyzetet emelték ki. A jelen esetben eredményeinkből arra következtetünk, hogy a magasabb végzettséggel rendelkező radiográfusok egyfajta diszkriminációs fázison esnek át, ezért érezhetik azt, hogy az emberi kapcsolatok területén elszemélytelenednek.

A szakirodalomban egymásnak ellentmondó eredmények olvashatók az életkor, az egészségügyben eltöltött évek és a kiégés viszonylatában. Egyes tanulmányok a pályakezdők korosztályát találták veszélyeztetettnek, mások pedig a tapasztaltabb korosztályt. Számos tanulmány a fokozott fizikai és érzelmi megterhelést, a felelősséget és az alváshiányt tartja a fiatal munkaerő fokozott kiégésének hátterében. Az eredmények szerint a pályakezdő szakdolgozók körében a legalacsonyabb a kiégés és az elégedettség, míg a 10–20 éve az egészségügyben dolgozók értéke a legmagasabb [29–32]. Jelen tanulmányunk során az emocionális kimerülés és a deperszonalizáció-dimenziókban az életkor viszonylatában a kezdeti éveket követően folyamatosan emelkedő értékeket figyelhetünk meg. A válaszadók 35. életévét követően az említett két dimenzió átlagértéke folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, mely értékek hátterében a munkakörbe való beleszokás és a munkakörnyezet elfogadása játszhat szerepet. A személyes hatékonyság dimenziójában tapasztalt átlagérték a 31–35 éves szakdolgozók csoportjánál kissé alacsony értéket mutat a többi korcsoport értékéhez képest, azonban a jelen érték még így is magasban meghaladja az MBI-átlagértéket. Ugyanezen jellegzetesség figyelhető meg a 11–15 éve az egészségügyben dolgozók csoportjánál is. Az alacsonyabb érték hátterében a deperszonalizáció és az emocionális kimerülés dimenziójához hasonlóan a munkakörnyezet megszokása állhat, mely érzet során hajlamosak vagyunk az esetleges pozitív visszajelzéseket kevésbé érzékelni, megszokottak véljük azokat. Az egészségügyben eltöltött évek a deperszonalizáció és az emocionális kimerülés dimenziójának kezdeti emelkedett értékeinek enyhe csökkenése után egy újabb kicsúcsosodás jellemző a 16–20 éve az egészségügyi pályán lévő válaszadók között. Az értékek az évek haladásával csökkennek, mely jelenség hátterében meghúzódnak okok vizsgálata további kutatásokat igényel.

A kiégés jelenségének megelőzése világszerte az egyik legnagyobb kihívást jelentő probléma; számos, kiégést megelőző program indult útjára, melyek sikerességét kutatási eredmények támasztják alá. A kiégés prevenciója szempontjából a megoldás szervezeti vagy egyéni szintű lehet. Az egészségügyi ellátórendszer szervezeti szinten jobb munkafeltételeket biztosíthat, a munkahelyi stressz kezelésében nyújthat segítséget, továbbá folyamatos fejlődési lehetőségeket biztosíthat. A radiológiai osztályok

működése során háttérbe szorult az osztályértekezletek, teammegbeszélések fontossága. Az osztályértekezletek kiváló lehetőséget teremtenek többek között a problémák felvetésére, a brainstorming vagy más problémamegoldó, szinte minden szakdolgozó véleményét figyelembe vevő módszer alkalmazható az adott probléma megoldására. A szakdolgozók sokszor akár tájékozatlanok is vélhetik magukat, aminek oka feltehetően a kellő mértékű és minőségű kommunikáció hiánya vezető és beosztott között. Az egyéni szintű stresszkezelésben többek között a relaxációs technikák, az önfejlesztés és az önismeret növelése, a stresszoldó technikák gyakorlása, valamint a testmozgás is a munkavállaló segítségére lehet [33].

Következtetés

Kutatásunk egy eddig még kevésbé vizsgált területet helyez fókuszába magyarországi viszonylatban. Az orvosi képzést segítő számos páciens veszi igénybe, gondolva itt a legkisebb traumáktól egészen a komoly operációk utánkötésére. A radiológiai osztályokon dolgozó szakdolgozók az átlagnál magasabb deperszonalizációs és emocionális kimerülési értékekkel bírnak, ami összefüggést mutat részben az egészségügyben eltöltött idővel és az életkorral. A személyes hatékonyság dimenziójában mért magasabb skálaértékek hátterében a páciensektől és munkatársaktól kapott visszajelzés pozitív hatása állhat. A deperszonalizáció és az emocionális kimerülés dimenzióinak emelkedett értéke, továbbá a relatíve magas átlagéletkor figyelmeztető jel lehet a munkáltatók számára a változás irányában. A munkavállaló mint egyén a személyes kompetenciáinak fejlesztésében találhatja meg a megoldást a kiégés szintjének mérséklésére, legyen az egyetemi képzésekben, kutatásokban, oktatásban, konferenciákon való részvétel. A kapott eredményeink jól korrelálnak a nemzetközi kutatások eredményeivel, kutatásaink azonban a jövőben mélyebbre kell, hogy hatoljanak a jelenség mögött húzódnak okok felderítésére.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támogatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás: S. D.: Ötletgazda, kivitelezés, a kézirat elkészítése. V. V.: A kézirat elkészítése. P. A. A.: A kézirat elkészítése, adatfeldolgozás. K. A.: Adatfeldolgozás. P. Cs. M.: Statisztikai elemzés. Cs. Sz.: A kézirat elkészítése, kérdőívek. B. J.: Lektorálás, szerkesztés. M. M.: Lektorálás, szerkesztés. R. I.: Lektorálás, szerkesztés. K. Á.: Lektorálás, szerkesztés. A cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdeklőségek: A szerzőknek nincsenek érdeklőségeik.

Irodalom

- [1] Akroyd D, Caison A, Adams RD. Burnout in radiation therapists: the predictive value of selected stressors. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2002; 52: 816–821.
- [2] Maslach C, Schaufeli W, Leiter M. Job burnout. *Annu Rev Psychol.* 2001; 52: 397–422.
- [3] Probst H, Griffiths S, Adams R, et al. Burnout in therapy radiographers in the UK. *Br J Radiol.* 2012; 85: e760–e765.
- [4] Chiesa A, Serretti A. Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: a review and meta-analysis. *J Altern Complement Med.* 2009; 15: 593–600.
- [5] Ugwu AC, Egwu OA, Ochie K, et al. Incidence of occupational stress among medical radiographers: a population based zonal survey. *Niger J Physiol Sci.* 2007; 22: 123–127.
- [6] Shanafelt TD, Sloan JA, Habermann TM. The well-being of physicians. *Am J Med.* 2003; 114: 513–519.
- [7] Queros C, Carlotto MS, Kaiseler M, et al. Predictors of burnout among nurses: an interactionist approach. *Psicothema* 2013; 25: 330–335.
- [8] Fusz K, Pakai A, Kívés Zs, et al. Work schedules in the Hungarian health care system and the sleep quality of nurses. [Munkarendek a hazai egészségügyi rendszerben, és az ápolók alvászminősége.] *Orv Hetil.* 2016; 157: 379–384. [Hungarian]
- [9] Maslach C, Jackson SE, Leiter M, et al. Maslach Burnout Inventory Manual. Consulting Psychologist Press, Palo Alto, CA, 1996.
- [10] West CP, Dyrbye LN, Satele DV, et al. Concurrent validity of single-item measures of emotional exhaustion and depersonalization in burnout assessment. *J Gen Intern Med.* 2012; 27: 1445–1452.
- [11] Palfi I, Nemeth K, Kerekes Zs, et al. The role of burnout among Hungarian nurses. *Int J Nurs Pract.* 2008; 14: 19–25.
- [12] Bencés I. Nurses and burnout. [Az ápolók és a kiégés.] *Nővér* 2006, 19(3): 10–16. [Hungarian]
- [13] Hall-Kenyon KM, Bullough RV, MacKay LK, et al. Preschool teacher well-being: a review of the literature. *Early Childhood Educ J.* 2014; 42: 153–162.
- [14] Gyórfy Z, Girasek E. Burnout among Hungarian physicians. Who are the most jeopardized? [Kiégés a magyarországi orvosok körében. Kik a legveszélyeztetettebbek?] *Orv Hetil.* 2015; 156: 564–570. [Hungarian]
- [15] Mackay SJ, Baker R, Collier D, et al. A comparative analysis of emotional intelligence in the UK and Australian radiographer workforce. *Radiography* 2013; 19: 151–155.
- [16] Hutton D, Probst H, Patel I, et al. OC-0560: Job satisfaction of the UK radiotherapy workforce: physics and radiography, a strategy to improve satisfaction. *Radiother Oncol.* 2013; 106(Suppl 2): S214–S215.
- [17] Singh N, Wright C, Knight K, et al. Occupational burnout among radiation therapists in Australia: findings from a mixed methods study. *Radiography* 2017; 23: 216–221.
- [18] Girgis A, Hansen V, Goldstein D. Are Australian oncology health professionals burning out? A view from the trenches. *Eur J Cancer* 2009; 45: 393–399.
- [19] Sipos D, Vandulek Cs, Petone Csima M, et al. The attrition and migration behaviour among Hungarian radiographers. *Glob J Health Sci.* 2017; 10: 1.
- [20] Buskov L, Abild A, Christensen A, et al. Radiographers and trainee radiologists reporting accident radiographs: a comparative plain film-reading performance study. *Clin Radiol.* 2013; 68: 55–58.
- [21] Kelly BS, Rainford LA, Gray J, et al. Collaboration between radiological technologists (radiographers) and junior doctors during image interpretation improves the accuracy of diagnostic decisions. *Radiography (Lond).* 2012; 2: 90–95.
- [22] Lockwood P, Piper K, Pittock L. CT head reporting by radiographers: results of an accredited postgraduate programme. *Radiography (Lond).* 2015; 21: e85–e89.
- [23] Lockwood P. CT sinus and facial bones reporting by radiographers: findings of an accredited postgraduate programme. *Dentomaxillofac Radiol.* 2017; 46: 20160440.
- [24] Piper K, Pittock L, Woznitza N. Radiographer reporting of neurological magnetic resonance imaging examinations of the head and cervical spine: findings of an accredited postgraduate programme. *Radiography* 2018; 24: 366–369.
- [25] Stenman C, Jamil S, Thorelius L, et al. Do radiologists agree on findings in radiographer-acquired sonographic examinations? *J Ultrasound Med.* 2013; 32: 513–518.
- [26] West CP, Shanafelt TD, Kolars JC. Quality of life, burnout, educational debt, and medical knowledge among internal medicine residents. *JAMA* 2011; 306: 952–960.
- [27] Oláh A, Máté O, Betlehem J, et al. The international practice and acceptance concept on Hungary of the Advanced Practice Nurse (APN) training on the MSc level. [Advanced Practice Nurse (APN) MSc képzés bevezetése Magyarországon.] *Nővér* 2015; 28(2): 3–10. [Hungarian]
- [28] Syed AB, Zoga AC. Artificial intelligence in radiology: current technology and future directions. *Semin Musculoskelet Radiol.* 2018; 22: 540–545.
- [29] Dyrbye LN, Varkey P, Boone SL, et al. Physician satisfaction and burnout at different career stages. *Mayo Clin Proc.* 2013; 88: 1358–1367.
- [30] Aminazadeh N, Farrokhyar F, Naeeni A. Is Canadian surgical residency training stressful? *Can J Surg.* 2012; 55: S145–S151.
- [31] Tyssen R, Vaglum P. Mental health problems among young doctors: an updated review of prospective studies. *Harv Rev Psychiatry* 2002; 10: 154–165.
- [32] Ádám Sz, Torzsa P, Gyórfy Zs, et al. Frequent occurrence of level burnout among general practitioners and residents. [Gyakori és magas fokú kiégés a háziorvosok és a háziorvosi rezidensek körében.] *Orv Hetil.* 2009; 150: 317–323. [Hungarian]
- [33] Reghehr C, Glancy D, Pitts A, et al. Interventions to reduce the consequences of stress in physicians: a review and meta-analysis. *J Nerv Ment Dis.* 2014; 202: 353–359.

(Sipos Dávid,

Kaposvár, Szent Imre u. 14/B, 7400

e-mail: cpt.david.sipos@gmail.com)