Az első két sikeres, convalescens friss fagyasztott plazmával történő terápia hazai alkalmazása intenzív osztályon kezelt, kritikus állapotú, COVID-19-fertőzésben szenvedő betegekben

Bobek Ilona dr.^{*1} ■ Gopcsa László dr.^{*2} ■ Réti Marienn dr.³
Bekő Gabriella dr.⁴ ■ Hancz Lilla dr.¹ ■ Lakatos Botond dr.⁵
Molnár Eszter dr.¹ ■ Nagy Sándor dr.⁶ ■ Reményi Péter dr.²
Sebestyén Gabriella dr.¹ ■ Sinkó János dr.² ■ Szlávik János dr.⁵
Szolnoky Miklós dr.⁷ ■ Vályi-Nagy István dr.^{1, 5}

¹Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Intenzív Terápiás Osztály, Budapest

²Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet,
Hematológiai és Össejt-transzplantációs Osztály, Budapest

³Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet,
Hematológiai és Össejt-transzplantációs Osztály, Apheresis és Össejt-feldolgozó Részleg, Budapest

⁴Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Központi Laboratórium, Budapest

⁵Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Infektológiai Osztály, Budapest

⁶Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest

⁷Biotest Hungaria Kft., Törökbálint

Bevezetés: Jelenleg nem áll rendelkezésünkre specifikus kuratív kezelés vagy vakcina az új koronavírus-2 (COVID-19, SARS-CoV-2) kezelésére. A súlyos citokinvihar-szindrómával társuló COVID-19-fertőzés kezelésére sürgősen szükséges alternatív kezelési megoldást találni.

Célkitűzés: A convalescens plazmaterápia alkalmazása más, súlyos vírusfertőzések kezelésében a túlélés javulását eredményezte, és ígéretes terápiás megközelítés lehet súlyos COVID-19-betegek számára.

Módszer: Két kritikus állapotú, COVID-19-fertőzött beteg convalescens friss fagyasztott plazmával történő kezelését mutatjuk be.

Eredmények: A plazmaterápia megkezdésekor mindkét beteg gépi lélegeztetésre szorult, és antivirális kezelésben, valamint maximális szupportív ellátásban részesült. A COVID-19-fertőzésből nemrég felépült és a súlyos akut légúti distressz szindrómát okozó koronavírus-2 elleni immunglobulin-G-t termelő donorokból 3 × 200 ml convalescens plazma transzfúzióját alkalmaztuk. A convalescens plazma transzfúzióját követően mindkét betegnél javult az oxigén-szaturáció, és a gyulladásos értékeket jelző paraméterek csökkenést mutattak. A convalescens plazma adását megelőző paraméterekhez viszonyítva növekedett a lymphocytaszám, és csökkent az interleukin-6-szint. Mindkét betegnél 2 héten belül megszüntethető volt a gépi lélegeztetés. Nem észleltünk a convalescens plazma adása során súlyos mellékhatást.

Következtetések: Megfigyelésünk alapján a convalescens plazmával történő terápia jól tolerálható volt, és javíthatja a betegek gyógyulási arányát. A convalescens plazmával való kezelés optimális dózisének, időpontjának és klinikai előnyének meghatározására további nagy, kontrollált vizsgálatok szükségesek. Közleményünk megírásának célja az első két, hazánkban convalescens plazmával sikeresen kezelt, kritikus állapotú COVID-19-fertőzött beteg kórtörténetének bemutatása.

Orv Hetil. 2020; 161(27): 1111–1121.

Kulcsszavak: COVID-19, SARS-CoV-2, convalescens plazma, interleukin-6

*Megosztott első szerzők

Successful administration of convalescent plasma in critically ill COVID-19 patients in Hungary: the first two cases

Introduction: At present, neither specific curative treatment nor vaccines for novel coronavirus 2019 (COVID-19) are available. There is an urgent need to look for alternative strategies for COVID-19 treatment especially in the case of severe and/or critically ill patients with cytokine release syndrome (CRS).

Aim: Convalescent plasma proved to increase survival rates in other severe viral infections. Therefore, convalescent plasma could be a promising treatment option for severe COVID-19 patients.

Method: In our article, we present the first two critically ill Hungarian patients with COVID-19 infection treated with convalescent fresh frozen plasma.

Results: At the time of plasma therapy both patients were on mechanical ventilation and received antiviral agents and a full scale of supportive care. Each patient received 3 × 200 mL of convalescent plasma of recently recovered donors with sufficient novel anti-coronavirus IgG titers. Subsequent to convalescent plasma infusion, oxygenization improved and inflammatory markers decreased in both individuals. As compared to pretransfusion, lymphocyte counts increased and interleukin-6 level lessened. Both patients were weaned from mechanical ventilation within 2 weeks of treatment. No severe adverse effects were observed.

Conclusions: Our experience indicates that convalescent plasma therapy is well tolerated and could potentially improve clinical outcomes. Optimal dose and timing as well as precise assessment of clinical benefit of convalescent plasma therapy will need further investigation in larger, well-controlled trials. This is the first report of the successful use of convalescent plasma in the treatment of critically ill patients with COVID-19 infection in Hungary.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, convalescent plasma, interleukin-6

Bobek I, Gopcsa L, Réti M, Bekő G, Hancz L, Lakatos B, Molnár E, Nagy S, Reményi P, Sebestyén G, Sinkó J, Szlávik J, Szolnoky M, Vályi-Nagy I. [Successful administration of convalescent plasma in critically ill COVID-19 patients in Hungary: the first two cases]. *Orv Hetil.* 2020; 161(27): 1111–1121.

(Beérkezett: 2020. május 13.; elfogadva: 2020. május 15.)

Rövidítések

ADCC = (antibody-dependent cellular cytotoxicity) antitest-függő sejt-közvetített citotoxicitás; ADCP = (antibody-dependent cellular phagocytosis) antitestfüggő cellularis phagocytosis; ADE = (antibody-dependent enhancement) antitestfüggő erősítés; ARDS = (acute respiratory distress syndrome) akut légúti distressz szindróma; BIKE = bispecifikus monoklonális antitestek; CAR = (chimeric antigen receptor) kimerikus antigénreceptor; CONTARST = COMparing Novel Treatment strategies Against SARS-CoV-Two; COPD = (chronic obstructive pulmonary disease) krónikus obstruktív tüdőbetegség; COVID-19 = (coronavirus disease 2019) koronavírus-betegség 2019; COVID-19-FFP = COVID-19-fertőzésen átesett betegektől származó convalescens friss fagyasztott plazma; CP = convalescens plazma; CRP = C-reaktív protein; CRS = (cytokine release syndrome) citokinvihar-szindróma; CT = (computed tomography) számítógépes tomográfia; DPC-OHII = Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet; EIA = enzim-immunoassay; ELISA = (enzyme-linked immunosorbent assay) enzimhez kapcsolt immunsorbens-vizsgálat; ETT = Egészségügyi Tudományos Tanács; FDA = (U.S. Food and Drug Administration) az USA Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala; FFP = friss fagyasztott plazma; GGO = (ground-glass opacity) tejüveghomály; hCHQ = (hydroxychloroquine) hidroxiklorokin; HIV = (human immunodeficiency virus) emberi immunhiányt előidéző vírus; IgA = immunglobulin A; IgG = immunglobulin-G; IgM = immunglobulin M; IL6 = interleukin-6; IVIG = intravénás immunglobulin; JAK/STAT = (Janus kinase/signal transducers and activators of transcription) Janus-

kináz/szignáltranszduktorok és transzkripció aktivátorok; LDH = laktátdehidrogenáz; LMWH = (low-molecular-weight heparin) kis molekulatömegű heparin; MERS = (Middle East respiratory syndrome) közel-keleti légzési szindróma; NNK = Nemzeti Népegészségügyi Központ; OMSZ = Országos Mentőszolgálat; OVSZ = Országos Vértelátó Szolgálat; PaO₂/FiO₂ = (partial pressure of oxygen/fraction inspired oxygen) parciális oxigénnyomás/belégzett O₂-koncentráció; PCR = (polymerase chain reaction) polimeráz-lánreakció; RNS = ribonukleinsav; SARS = (severe acute respiratory syndrome) súlyos akut légzőszervi tünetegyüttes; SARS-CoV-1 = (severe acute respiratory syndrome coronavirus 1) súlyos akut légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus-1; SARS-CoV-2 = (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) súlyos akut légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus-2; sHLH/MAS = (secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis/macrophage activation syndrome) másodlagos haemophagocytás lymphohistiocytosis/macrophagaktivációs szindróma; TACO = (transfusion-associated circulatory overload) transzfúzióhoz kapcsolódó keringés-túlterhelés; TRALI = (transfusion-related acute lung injury) transzfúzióhoz kapcsolódó heveny tüdő-sérülés; TUKEB = Tudományos és Kutatásügyi Bizottság; USA = (United States of America) Amerikai Egyesült Államok

A járványosan először a kínai Vuhanban megjelenő új koronavírus-betegség 2019 (COVID-19) gyorsan terjed világszerte. Jelenleg nincs elérhető kuratív terápia vagy vakcina a COVID-19-fertőzés leküzdésében [1]. Ráadásul a halálos kimenetelű esetek száma is gyorsan

növekszik világszerte, ezért a súlyos szövődmények kezelése hatékony gyógymódjának megtalálása meglehetősen sürgős kérdés [1]. A publikáció írásának idején, 2020. május 11-én Magyarországon 3284 COVID-19-fertőzött esetet regisztráltak, és 421 fertőzött meghalt; a becsült halálozási arány 12,8%-nak adódik. A súlyos és kritikus COVID-19-esetek klinikopatológiai vizsgálata során egyértelműen bizonyítást nyert a citokinvihar-szindróma (cytokine release syndrome, CRS) fennállása [1–3]. A CRS jelenléte két további meggon-doláshoz vezetett. Először is az új terápiás módszerek térhódítása a hematológiai és őssejt-transzplantációs gyakorlatban, úgymint a bispecifikus monoklonális antitestekkel (BIKE), a haploidentikus őssejt-transzplantációjával és a kimerikus antigénreceptort tartalmazó T-sejttel (CAR-T-sejt) való kezelés – a saját gyakorlatunkban is – előtérbe hozta a CRS megismerését és hatékony kezelését [4]. Ezen esetekben a CRS kialakulásának patomechanizmusa sem teljesen ismert, de az interleukin-6 (IL6)-ellenes monoklonális antitesttel, a tocilizumabbal való kezelés hatékony terápiás megoldásnak bizonyult. Másodszor, visszatekintve a SARS-CoV-1, a MERS, a H1N1 és a H5N1 okozta súlyos komplikációkra: az akut légúti distressz szindróma (ARDS), a hypercytokinaemia kirajzolja, hogy a fenti esetekben is CRS-sel állunk szemben [1, 5, 6]. A COVID-19-CRS-hez társult ARDS kezelésében – a jelenleg is folyó randomizált vizsgálatok eredményei ismeretének hiányában is – számos terápiás tapasztalatot szereztek világszerte [2, 3]. Ilyen terápiás megfontolás lehet a korábban említett tocilizumab mellett egyéb monoklonális antitesttel történő terápia (IL1, tumornekrózisfaktor-alfa), a Janus-kináz-gátlás (JAK/STAT), a nagy dózisú intravénás immunglobulin és a COVID-19-fertőzéstől meggyógyult donorokból származó convalescens plazma (CP) alkalmazása [4]. A fenti terápiás modalitások befolyásolják a hypercytokinaemiát és a vírusclearance-t.

A CP adásának története az 1890-es években kezdődött. Alkalmazásához mindig csak ún. vészhelyzet esetén nyúlt az orvostudomány, olyan súlyos, elsősorban virális fertőzésekben, amelyekben megállapított hatékony terápia nem állt rendelkezésünkre [1]. Az ún. békebeli időkben sehol nem végeztek kontrollált vizsgálatot a CP hatékonyságának felmérésére, ennek megfelelően alkalmazásának módja, pontos dózisa, biztonságossága, hatékonyságának felmérése és részletes kiértékelése soha sem következett be. Az utóbbi két évtizedben a CP-t kielégítő hatékonysággal és biztonsággal használták a súlyos ARDS-t okozó koronavírus-1 (SARS-CoV-1), a közlekeleti légúti distressz szindróma hátterében álló koronavírus-betegség (MERS), valamint a H1N1-influenza A pandémia során, ezért észszerűnek látszik a terápiás lehetőség alkalmazása súlyos/kritikus COVID-19-fertőzés kezelésére [1, 5–7]. A pandémia lefolyása során hétről hétre mind több és több beteg gyógyul fel a COVID-19-ből, ezért a CP-terápia egyre jobban elérhető terápiás lehetőséget jelenthet a betegek számára. Ennek meg-

felelően a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézete (DPC-OHII) és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) közreműködésével a CONTARST- (COMparing Novel Treatment strategies Against SARS-CoV-Two) vizsgálat keretében elindult a súlyos és kritikus COVID-19-fertőzöttek kezelésére a CP-terápiás program. Közleményünk megírásának célja az első két, hazánkban CP-vel sikeresen kezelt, kritikus állapotú COVID-19-fertőzött beteg kórtörténetének bemutatása.

Módszer

A CONTARST-vizsgálat (CP-terápiás karjának ETT-TUKEB [Egészségügyi Tudományos Tanács-Tudományos és Kutatásetikai Bizottság] ügyiratszám: IV/3937-1/2020/EKU) keretében a gyógyult COVID-19-fertőzösten átesett betegektől származó convalescens friss fagyasztott plazmával történő terápia (COVID-19-FFP) alkalmazásának indikációit súlyos ARDS-t okozó koronavírus-2 (SARS-CoV-2) polimeráz-láncreakció (PCR) pozitív betegekben 4 beválasztási kritérium szerint határoztuk meg. A vizsgálatba (1) súlyos COVID-19-et, (2) kritikus COVID-19-et, (3) súlyos COVID-19-et előre jelző rizikófaktor jelenléte és a citokinvihar kialakulásának kockázatára utaló egy vagy több laboratóriumi eltérés együttes jelentléte és (4) a másodlagos haemophagocytás lymphohistiocytosis/macrophagaktivációs szindróma (sHLH/MAS) fennállása esetén vehetők fel betegek. A 4 beválasztási kritérium részletes jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza. A COVID-19-FFP alkalmazásához a további speciális kritériumok jelenléte is szükséges: az első tünetek jelentkezésétől kevesebb mint 14 nap teljen el, és a beteg még SARS-CoV-2-PCR-pozitív legyen. A COVID-19-FFP alkalmazásának kontraindikációját jelenti a 14 napnál régebben fennálló betegség, a 24 órán belüli, de maximum 48 órán belüli SARS-CoV-2-PCR-negatív eredmény, az IgA- vagy haptoglobinhány, a súlyos ismétlődő allergiás szövődmény vagy anaphylaxia a transzfúzió során, továbbá a folyadékterhelés elviselésének klinikai állapotot (TACO) rontó veszélye. A kritériumoknak megfelelően az első lépésben két kritikus COVID-19-fertőzött betegnél alkalmaztunk CP-terápiát. Klinikai információk a kórházi számítógépes rendszerből származó adatok összesítéséből, a képalakító vizsgálatok eredményeiből, a gépi lélegeztetési paraméterekből, valamint a virológiai vizsgálatok és a terápiás lapok adatainak összegyűjtéséből származtak. A vizsgálatba bevont betegek és a donorok – önműködő képességük korlátozottsága esetén jogi képviselőik – megismerték és aláírták a klinikai vizsgálat tájékoztatóját, és aláírásukkal igazoltan beleegyeztek a tanulmányban való részvételbe. A COVID-19-fertőzéstől felépült önkéntes donorok jelentkezése a kórházból elbocsátott felépült betegek felkérésével és a különböző honlapokon és médiumokban közzétett elérhetőségek felhasználásával történt. A donorok aláírták a donációról szóló bele-

1. táblázat | Convalescens COVID-19-FFP alkalmazásának kritériumai SARS-CoV-2-PCR-rel igazolt COVID-19-fertőzött betegekben

Speciális kritériumok a COVID-19-FFP-re	1) Az első tünetek jelentkezésétől kevesebb mint 14 nap telt el 2) A beteg még SARS-CoV-2-PCR-pozitív
1. Súlyos COVID-19	(Bármelyik paraméter fennállása esetén) 1) Légzésszám ≥ 30 /perc, gyorsan romló vérgázérték ($\text{PaO}_2 < 80$ Hgmm körlevegőn) 2) Fizikális vizsgálattal hallható zöreje és $\text{SpO}_2 \leq 93\%$ körlevegőn vagy oxigénszükséglet: Venturi-maszk $> 50\%$ 3) $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ Hgmm 4) CT-vel: a tüdőben multilobularis laesiók vagy a tüdőinfiltrátumok 50%-os progressziója 48 órán belül
2. Kritikus COVID-19	(Bármelyik fennállása esetén) 1) $\text{SpO}_2 \leq 90\%$, oxigénszükséglet: $\text{FiO}_2 > 100\%$ mellett 2) $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$ Hgmm 3) Gépi lélegeztetést igénylő légzési elégtelenség 4) Shock 5) Kombinációja bármely szervi elégtelenséggel, amely intenzív osztályos ellátást követel meg
3. Súlyos COVID-19-et előre jelző rizikófaktor jelenléte ÉS citokinvihar-szindróma (cytokine release syndrome, CRS) kialakulási kockázatának együttes fennállása	Súlyos COVID-19-et előre jelző rizikófaktorok (bármelyik fennállása esetén): 1) Életkor > 65 év 2) Krónikus cardiovascularis, tüdő-, máj-, vese-, hematológiai és neurológiai betegségek, valamint diabetes mellitus 3) Immunszupprimált állapot ÉS Citokinvihar kialakulási kockázatának laboratóriumi eredményei (a következők közül egy vagy több teljesül): 1) Szérum-IL6 $\geq 3 \times$ -osa a felső normálértéknek 2) Ferritin > 300 $\mu\text{g/l}$ 24 órán belül megkettőződik 3) Ferritin > 600 $\mu\text{g/l}$ és LDH > 480 U/l 4) Emelkedett D-dimer (> 1 mg/l)
4. A COVID-19-hez társult másodlagos haemophagocytosis lymphohistiocytosis/macrophagaktivációs szindróma (sHLH/MAS)	Ha az ún. HS-score > 169 pont, akkor a kritériumok teljesülnek ¹

¹A csontvelői haemophagocytosis nem szükséges a HLH diagnózisához. A HS-score számításához online HS-score-kalkulátor rendelkezésre áll: <http://saintantoine.aphp.fr/score/>. Cytopeniák: hemoglobin 9,2 g/l vagy kevesebb ($\leq 5,71$ mmol/l), fehérvérsejtszám 5 G/l vagy kevesebb, thrombocytaszám 110 G/l vagy kevesebb. Immunszuppresszió: HIV-pozitív vagy hosszú távú immunszuppresszív terápia (szteroidok, ciklosporin, azatioprin)

COVID-19 = koronavírus-betegség 2019; CT = számítógépes tomográfia; FFP = friss fagyasztott plazma; FiO_2 = belélegzett O_2 -koncentráció; HIV = emberi immunhiányt előidéző vírus; HLH = haemophagocytosis lymphohistiocytosis; HS-score = haemophagocytosis lymphohistiocytosis pontrendszer; IL6 = interleukin-6; PaO_2 = parciális oxigénnyomás; PCR = polimeráz-láncreakció; SARS-CoV-2 = súlyos akut légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus-2; sHLH/MAS = másodlagos haemophagocytosis lymphohistiocytosis/macrophagaktivációs szindróma; SpO_2 = a vér oxigéntelítettsége körlevegőn

egyező nyilatkozatot. A donációra való életkori alkalmaság általában 18 és 60 év között került meghatározásra, de biológiaiailag fitt és komorbiditással nem rendelkező személyek esetén a felső korhatár 70 év volt. Alkalmasság csak azok válhattak, akiknek a humán immundeficienciavírus (HIV-), hepatitis B-, hepatitis C- és syphilis tesztjük negatív eredményt mutatott. A kutatási programba önkéntesen jelentkező, igazoltan COVID-19-en átesett személyek, ha legalább 2 hete panasz- és tünetmentesek voltak, kétlépcsős kivizsgáláson vettek részt. Az első lépésben – az előszűrés során – orr-garat dupla mintavételből SARS-CoV-2-PCR (Nemzeti Népegészségügyi Központ, NNK és DPC-OHII), vírusspecifikus antitest vizsgálata (anti-SARS-CoV-2-ellenanyag mérése enzimhez kapcsolt immunszorbens-vizsgálattal [ELISA-módszerrel]; Alpha Diagnostic International, San Antonio, TX, USA), vérkép-, összefehérje-, IgG/IgA/IgM és labora-

tóriumi vércsoportvizsgálat történt. Amennyiben a donor légúti mintavételből történő mindkét PCR-vizsgálata negatív, emellett ELISA-módszerrel kimutatható IgG-típusú ellenanyaga volt, nem állt fenn véradást kizáró tényező, a donor vénái megfelelőek voltak, és a klinikai vizsgálatba való belegegyezési nyilatkozatot aláírta, a vérplazmát adó személyt az OVSZ-be irányítottuk. Az OVSZ felvette a kapcsolatot a donorral, és az általa megjelölt donor-plazmaferézisközpontba (Plazma Pont) küldte. A második lépésben donorkivizsgálás és plazmaferézis történt. A donor-ferézisközpontban a jogszabályban előírt vizsgálatokat követően megtörtént a plazmaferézis, 600 ml plazma gyűjtése hozzávetőleg 1 óra időtartam alatt. A végterméket besugárzásra, tárolásra és kiadásra áadták az OVSZ-nek. A készítmények 3×200 mL-es frakcióra osztva COVID-19 besugárzott FFP formájában kerültek kiadásra. Mindkét donor férfi (35, illet-

ve 51 éves) volt. Mindketten viszonylag enyhe tünetekkel vészték át a betegséget, lényeges társbetegség, rendszeres gyógyszeresedés egyikükénél sem volt. Mindketten légúti mintából SARS-CoV-2-PCR-negatívak voltak és ELISA-módszerrel IgG-típusú anti-SARS-CoV-ellenanyagot termeltek. A plazmagyűjtésre az első tünetekhez képest 4, illetve 5 hét múlva került sor. Szövődmény egyikükénél sem jelentkezett.

Eredmények

A convalescens COVID-19-plazma recipienseinek kórtörténete

Első eset

Ötvenkilenc éves férfi, akinek hosszabb távú anamnézisében hypertonia, inzulindependens diabetes mellitus, következményes retinopathia, néhány évvel korábban prostatocarcinoma miatt sugárterápia, krónikus gastritis és ez év eleje óta krónikus vesebetegség miatt intermittáló dialízisterápia szerepel. A beteg a CP első adagjának beadását megelőzően 12 nappal észlelte vizes hasmenését, amely miatt az aznapi dialíziskezelése el is maradt. Kétnapos panaszokkal a területileg illetékes sürgősségi ambulancián jelentkezett. Esetleges SARS-CoV-2-fertőzés miatt felvették a kórházba, majd elkülönítették. Megfigyelése alatt láz, hidegrázás alakult ki, laboratóriumi leleteiben lymphocytopeniát, emelkedett D-dimer-, laktátdehidrogenáz (LDH)-, kreatin-kináz-, triglicerid- és transzaminázértékeket észleltek. Krónikus vesebetegségének megfelelően enyhe anaemia, emelkedett szérumkreatinin és hyperkalaemia jellemezte. A felső

légutakból vett minta SARS-CoV-2-PCR-tesztje pozitív lett. Az akkor elvégzett mellkasröntgen csak mérsékelt fokozott bronchovascularis rajzolatot mutatott, infiltrátumra utaló jelet nem. Ezt követően a reguláris dialízis elvégzése céljából az enyhén zavart beteget áthelyezték a DPC-OHII Infektológiai Osztályára. A beteg érkezéskor láztalan volt, nem köhögött, köpete nem volt, torka nem fájt, gyakorlatilag panaszmentes volt. Az első tünet kialakulása óta 3 nap telt el. Infektológiai kezelése másnapján került sor a mellkas natív CT-vizsgálatára, két nappal a negatív mellkasröntgenlelet után. A tüdőben jelzett eltérések, mint a perifériás túlsúlyú és peribronchovascularis szabálytalan konszolidátumok és tejüveghomály (GGO), vascularis kiszélesedés és interlobularis septummegvastagodás COVID-19-pneumonitisre jellegzetesek voltak. Az Infektológiai Osztályon hidroxiklorokin- és azitromicinkezelésben részesült, amelyet piperacillin-tazobaktám terápiával egészítettek ki. A beteg állapota újra romlott, száraz köhögés jelentkezett, az alkalmazott oxigénterápia ellenére hypoxia lépett fel, így Intenzív Osztályunkra helyeztük át a légzési elégtelen beteget, aki a felvételét követően nem sokkal gépi lélegeztetésre szorult, mély szedálás mellett [7]. Invazív hemodinamikai monitorizálást alkalmaztunk. Tekintettel a hosszabb ideje kimaradt hemodialíziskezelésre, valamint a hemodinamikai instabilitásra, vazopresszor igényre azonnali folyamatos venovenosus dialízist alkalmaztunk citrát-antikoaguláció mellett (Ci-Ca CVVHD). Természetesen mérlegelésre került az ún. CytoSorb-kezelés indikációjának lehetősége is [7]. Sikert a beteg napi spontán vizeletürítésének mennyiségét megőrizni. Az ezt követő napokban a beteg subfebrilis volt, változó mennyiségű oxigénbevitelre szorult. A korábban álta-

1. ábra

Az első betegnél a convalescens plazma beadását követően mind a fehérvérsejt, mind az abszolút lymphocytaszám, illetve a thrombocytaszám megemelkedett

AEos = abszolút eosinophylszám (G/l); ALC = abszolút lymphocytaszám (G/l); Fvs = fehérvérsejtszám (G/l); Thr = thrombocytaszám (G/l)

2. ábra

Az első betegnél a procalcitonin-, a ferritin és az IL6-szint közvetlenül a plazma beadását követően kismértékben megemelkedett, majd egyenes csökkenést mutatott

CRP = C-reaktív protein (mg/l); IL6 = interleukin-6 (pg/ml); mértékegységek: procalcitonin (ng/ml); ferritin (ng/ml)

lunk kezelt COVID-19-betegekhez hasonlóan a beteg állapota látványos javulást nem mutatott. Ekkor merült fel, hogy betegünk – elsőként Magyarországon – CP-terápiában részesüljön. A vércsoportegyezés ismeretében, a vizsgálati protokollnak megfelelően, a beteg nyilatkozatképtelensége miatt megszereztük a beteg legközelebbi hozzátartozójának írásos beleegyezését. A fentieket követően betegünk 2020. 04. 23-án az első adag (200 ml), majd ezt követően még két alkalommal COVID-19-en átesett férfi donortól származó CP-vel terápiában részesült. A beteg vérképének és gyulladásos paramétereinek a CP előtti, majd a beadást követő értékeinek változását a tizenötödik napig az 1. és 2. ábra szemlélteti. Az első CP beadására a beteg intenzív osztályos gépi lélegeztetésének negyedik napján került sor. Ezt követően egy héttel, összesen 11 nap gépi lélegeztetés után a beteget sikeresen extubáltuk. Azóta spontán légzése, oxigenizációja kielégítő. Az elvégzett kontroll-mellkas-CT-vizsgálat a korábban leírt, GGO jellegű eltérések döntő többségének regresszióját mutatta. Másodlagos fertőzés miatt széles spektrumú antimikrobás terápiában részesült, amelyre jól reagált. A beteg felső légúti mintái még a vírus ürítésére utalnak, a vér PCR-vizsgálatának megfelelően azonban a viraemia megszűnt. A beteg rehabilitációját megkezdjük.

Második eset

A 72 éves férfi beteg heteroanamnézisében schizofrenia, másodlagos Parkinson-szindróma, hypertonia, cerebrovasculáris, krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), emphysema, atopiás dermatitis, köszvény, incontinencia szerepel. Az OMSZ szállította a szociális otthonban ápolt, biológiai kora alapján idős férfi beteget légzési elégtelenség miatt közvetlenül intézetünk Intenzív Osztályára. Szinte azonnal gépi lélegeztetést kellett alkalmaznunk [7]. A mély légúti minta SARS-CoV-

2-pozitivitása egyértelművé tette a COVID-19-pneumóniás jelenlétét. Eleinte magas oxigénbevitelre, illetve keringéstámogató vazopresszorterápiára szorult a beteg. Lélegeztethetősége nem igazán mutatott javulást az alkalmazott 'prone' pozíció ellenére sem. A tüdő fizikális állapota és a légzés mechanikája egyértelművé tette, hogy az úgynevezett L-fenotípusból H-fenotípusba váltott a beteg [8]. Ennek következtében az oxigénbevitel emelni kellett, a $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ aránya romlott. Az elvégzett kontrasztanyag mellkasi CT-vizsgálat az anti-Xa-titer monitorizálása mellett alkalmazott, terápiás dózissal kis molekulatömegű heparinos (LMWH) kezelés ellenére jobb oldalon nem friss jellegű, az arteria pulmonalis főtrunkusában macro-, illetve több lebenyt érintő segmentális és subsegmentális ágakban többszörös micro-embolisatióknak megfelelő kontrasztanyag-halmozásban

3. ábra

A második beteg jobb oldali arteria pulmonalisában elhelyezkedő thrombus. Megjegyzés: a nyíl az angiográfias komputertomográfiával kimutatott thrombust mutatja

4. ábra

A második betegnél a convalescens plazma beadását követően mind a fehérvérsejt-, mind az abszolút lymphocita-, az abszolút eosinophyl-, illetve a thrombocytaszám látványosan megemelkedett

AEos = abszolút eosinophylszám (G/l); ALC = abszolút lymphocytaszám (G/l); Fvs = fehérvérsejtszám (G/l); Thr = thrombocytaszám (G/l)

5. ábra

A második betegnél a CRP-, a procalcitonin- és a ferritinszint közvetlenül a convalescens plazma beadását követően jelentős mértékben megemelkedett, majd egyenletes szignifikáns csökkenést mutatott

CRP = C-reaktív protein (mg/l); IL6 = interleukin-6 (pg/ml); mértékegységek: procalcitonin (ng/ml); ferritin (ng/ml)

elmaradó területeket igazolt. A tüdőparenchymában jelzett, részben konsolidatív, részben GGO és interstitialis jellegű eltérések morfológiája és lokalizációja is a COVID-19-infekció lehetőségét támasztotta alá (3. ábra). Hemodinamikai instabilitása miatt hosszan szorult változó mennyiségű vazopresszoros terápiára; átmenetileg pitvarfibrillációs arrhythmia lépett fel, láza, subfebrilitása több napon át tartott az alkalmazott antimikrobás kezelés ellenére. Vesefunkciója a konzervatív terápiára lassan javult; a folyamatos vesepótló kezelés lehetősége többször felmerült, de végül nem szorult rá a beteg. A klinikai képet színezte a több napon át tartó, nehezen oldódó paralyticus ileus, majd a *Clostridium*

difficile okozta enteritis. A multimorbid beteg esetében a vércsoportegyezés lehetőséget adott arra, hogy CP-terápiában részesüljön. Előzetes írásos beleegyezést követően a beteg 2020. 05. 03-án megkapta az első, majd az azt követő két napon a teljes adag CP-t. A beteg vérképének és gyulladásos paramétereinek a CP előtti, majd a beadást követő értékeinek változását a 8. napig a 4. és 5. ábra szemlélteti. A beteg izomerejének nagyfokú gyengesége miatt műtéti tracheostomát képeztünk. Ezt követően, az intenzív osztályos kezelésének 21., míg a CP harmadik, utolsó adagjának beadását követő 6. napon a gépi lélegeztetést felfüggesztettük. A beteg alsó légúti mintája az utolsó CP beadását követő 5., intenzív osztályos kezelésének 20. napján vált negatívvá a SARS-CoV-2 szempontjából.

Megbeszélés

Közlönyünkben két kritikus állapotú COVID-19-fertőzött férfi beteg sikeres CP-kezelésének eredményét mutattuk be a klinikai állapot alakulása és a laboratóriumi eredmények által igazoltan. Mindkét beteg számos társbetegséggel rendelkezett, melyek közül kiemeljük a hypertoniát és a cardiovascularis betegséget. Egyiküknél a hosszú ideje fennálló diabetes mellitus talaján kialakult veseelégtelenség is gyarapította a rizikófaktorok számát. Mindkettőnél kétoldali tüdőinfiltrátum és súlyos légzési elégtelenség alakult ki, ami gépi lélegeztetés alkalmazását igényelte. A laboratóriumi paraméterek egyértelműen alátámasztották a CRS fennállását az ARDS hátterében. Antivirális kezelésként az intézetünkben standard azitromicin- és hidroxiklorokin-kezelést alkalmaztuk. A gépi lélegeztetés 8. és 13. napján CP-transzfúziót adtunk 3 × 200 ml dózisban. A CP-kezelést követően a lymphocytopenia néhány nap alatt normalizálódott. A CRP-értékek kb. 50%-os csökkenést mutattak, de a komorbiditások miatt fellépő szuperinfekciók hatására tartósan emelkedettek maradtak. Az emelkedett IL6-szint a CP-kezelésre az első betegben átmenetileg emelkedett ugyan, ám azután csökkent; a második betegben lényegesen nem változott a szint. A ferritinszint az IL6-hoz hasonlóan viselkedett. Az első esetben az igen határozott D-dimer-emelkedés prompt választ mutatott a CP-transzfúzióra. Mindkét betegnél a teljes dózisú CP beadását követően 6 és 11 nap elteltével a mesterséges lélegeztetést fel tudtuk függeszteni. Az első esetben a SARS-CoV-viraemia megszűnt, de a bronchoalveolaris minta elhúzódóan pozitív PCR-eredményt adott. A második betegnél a vírus ürítése megszűnt. Mindkét esetben kimutatható volt a SARS-CoV-2-IgG ELISA-módszerrel. Jelenleg a COVID-19 CP-terápiájáról korlátozott számú tudományos közlemény olvasható a nemzetközi szakirodalomban, melyek főbb eredményeit a 2. táblázat mutatja be. Az elsőként publikált kínai közleményben 5 kritikus betegen alkalmaztak CP-t 1 × 400 ml dózisban [9]. A tünetek megjelenése és a CP alkalmazása között több mint 14 nap telt el. Négy betegnél az

2. táblázat | Esetismertetések és kis betegcsoporton alkalmazott convalescens COVID-19 friss fagyasztott plazmával történő terápia eredményei SARS-CoV-2-PCR-rel igazolt COVID-19-fertőzött betegekben

Irodalom	Életkor/ Nem	A betegség súlyossága	Antivirális kezelés	Szteroid	CT	A tünetek és a CP adása között eltelt idő (nap)	CP-dózis (ml)	CP adása után a SARS-CoV- 2-PCR negatív (nap)	CP adása után a CT javulása (nap)	CP adása után extubá- ció (nap)	Kimenetel
Shen és mtsai [9]											
1.	73/ffi	Kritikus	Lopinavir/ ritonavir, IFN α , favipiravir	Igen	Nem	24	1 × 400	12		–	Stabil, gépi lélegeztetés
2.	60/ffi	Kritikus	Lopinavir/ ritonavir, arbidol, darunavir	Igen	Nem	14	1 × 400	12		–	Stabil, gépi lélegeztetés
3.	50/nő	Kritikus	Lopinavir/ ritonavir, IFN α	Igen	Nem	22	1 × 400	3		2	Meggyógyult
4.	36/nő	Kritikus	IFN α , favipiravir	Igen	Nem	21	1 × 400	3		9	Meggyógyult
5.	60/ffi	Kritikus	Lopinavir/ ritonavir, IFN α	Igen	Nem	23	1 × 400	1		9	Meggyógyult
Ahn és mtsai [10]											
1.	70/ffi	Kritikus	hCHQ, lopinavir/ ritonavir	Igen	Kétoldali infiltrátum	22	2 × 250	16	16	NA	Meggyógyult
2.	67/ffi	Kritikus	hCHQ, lopinavir/ ritonavir	Igen	Kétoldali infiltrátum	7	2 × 250	14	NA	3	Meggyógyult
Duan és mtsai [11]											
1.	46/ffi	Kritikus	Arbidol, ribavirin	Nem	Kétoldali infiltrátum + GGO	11	1 × 200	1	NA	2	3 Meggyó- gyult, 7 klinikai javulás
2.	34/nő	Súlyos	Arbidol	Nem	Kétoldali infiltrátum + GGO	11	1 × 200	2	NA		NA
3.	42/ffi	Kritikus	Arbidol	Igen	Kétoldali infiltrátum + GGO	19	1 × 200	1	NA	+	NA
4.	55/nő	Kritikus	Ribavirin	Igen	Kétoldali infiltrátum + GGO	19	1 × 200	1	NA	+	NA
5.	57/ffi	Súlyos	Arbidol, remdesivir IFN α ,	Igen	Kétoldali infiltrátum + GGO	14	1 × 200	2	NA		NA
6.	78/nő	Súlyos	Arbidol	Igen	Kétoldali infiltrátum + GGO	17	1 × 200	2	NA		NA
7.	56/ffi	Súlyos	Arbidol	Igen	Kétoldali infiltrátum + GGO	16	1 × 200	2	NA		NA

2. táblázat folyt.

Irodalom	Életkor/ Nem	A betegség súlyossága	Antivirális kezelés	Szteroid	CT	A tünetek és a CP adása között eltelt idő (nap)	CP-dózis (ml)	CP adása után a SARS-CoV- 2-PCR negatív (nap)	CP adása után a CT javulása (nap)	CP adása után extubá- ció (nap)	Kimenetel
8.	67/ffi	Súlyos	Arbidol	Nem	Kétoldali infiltrátum + GGO	20	1 × 200	2	NA		NA
9.	49/nő	Súlyos	Arbidol, oseltamivir, peramivir	Nem	Kétoldali infiltrátum + GGO	10	1 × 200	2	NA		NA
10.	50/ffi	Súlyos	Arbidol, IFN α	Igen	Kétoldali infiltrátum + GGO	20	1 × 200	5	NA		NA
Ye és mtsai [12]											
1.	69/ffi	Súlyos	–	–	Kétoldali infiltrátum	32	3 × 200	9	4		Meggyógyult
2.	75/nő	Súlyos	–	–	Kétoldali infiltrátum	26	2 × 200	9	6		Meggyógyult
3.	56/ffi	Súlyos	–	–	Kétoldali infiltrátum	32	3 × 200	NA	6		Meggyógyult
4.	63/nő	Súlyos	Arbidol	–	Kétoldali infiltrátum	30	1 × 200	1	4		Meggyógyult
5.	28/nő	Tünet- mentes	–	–	Negatív	32	1 × 200	1	–		Meggyógyult
6.	57/ffi	Súlyos	–	–	Kétoldali infiltrátum	49	1 × 200	NA	3		Meggyógyult

COVID-19 = koronavírus-betegség 2019; CP = convalescens plazma; CT = számítógépes tomográfia; ffi = férfi; GGO = tejüveghomály; hCHQ = hidroxiklorokin; IFN α = interferon-alfa; NA = nem elérhető adat; PCR = polimeráz-láncreakció; SARS-CoV-2 = súlyos akut légzőszervi tünet-együtttest okozó koronavírus-2

IL6-szintek a CP beadását követően is tovább emelkedtek, a csúcserőteket a 3. napra érték el, majd fokozatos elnyújtott csökkenést mutattak. A viraemia a SARS-CoV-2-PCR szerint a 12. napon negatívvá vált. A CP hatására három beteg meggyógyult, és további kettő állapotát stabilizálódott [9]. Egy dél-koreai munkacsoport két kritikus állapotú esetet közölt 2 × 250 ml CP alkalmazásával az első tünetek megjelenésétől számítva 7 és 22 nappal [10]. A többi publikációval ellentétben az IL6-szintek gyors normalizálódását észlelték. Mindkét beteget extubálták, és hazaengedték a kórházból [10]. Duan és mtsai 10, túlnyomórészt súlyos állapotú, CT-vel igazolt kétoldali infiltrátummal rendelkező, új típusú koronavírus-fertőzött beteget kezeltek 1 × 200 ml CP-transzfúzió adásával [11]. A CP adására három beteg meggyógyult, és hét esetben klinikai javulás következett be. A közlemény hátránya, hogy a citokinszintek és a SARS-CoV-2-PCR-eredmények alakulása nem érhető el, de kiemelő, hogy a CT-morfológiai eltérések gyors regresszióját észlelték. Ye és mtsai – az általunk bemutatott két esethez hasonlóan – 200 ml-es egységenként alkalmaztak CP-terápiát túlnyomórészt súlyos COVID-19-betegen. Hat betegből ötnél a CT-infil-

rátumok és az oxigenizáció gyors javulását észlelték, megakadályozva ezáltal a súlyos állapotból kritikus állapotba vezető progressziót [12]. CT-vizsgálattal a morfológiai eltérések gyors, dinamikus regresszióját figyelték meg. Figyelemre méltó, hogy kórházunk protokolljától és ajánlásaitól eltérően a tünetek megjelenésétől számítva több mint 30 nappal alkalmazták a CP-t. Véleményük szerint a CP gyulladásgátló hatása megakadályozhatja a CRS súlyosbodását vagy kialakulását. Az irodalomban közölt esetek alapján megállapítható, hogy a COVID-19 CP-terápiája hatékony lehetőség, és mellékhatást nem észleltek [9–12]. A CP hatékonyságának egyértelmű megítélését jelenleg korlátozza az infekció korai fázisában lévő betegek hiánya, az egyidejűleg alkalmazott többféle kezelés és a kis betegszám [1, 9–12]. A CP hatásmechanizmusában elsősorban az antitesttartalom által a vírus közvetlen neutralizációja emelhető ki, de antitestmediált folyamatok – úgymint a komplementaktiváció, az antitestfüggő sejt-közvetített citotoxicitás (ADCC) és/vagy az antitestfüggő cellularis phagocytosis (ADCP) – szintén szerepet játszanak [1, 13]. Nem neutralizáló antitestek szintén a vírusokhoz kötődnek, de nem interferálnak *in vitro* rendszerekben a replikációképesseggel,

ami szintén elősegíti a fertőzésből való felépülést. Azonban számos, jelenleg nem teljesen feltérképezett paramétert is figyelembe kell venni a COVID-19 CP klasszikus passzív immunterápiaként különböző fertőzések prevenciójában és kezelésében. *Luke és mtsai* metaanalízisében történelmi utazást tehetünk az influenzavírus okozta „spanyolnátha” idejére, amikor 1918 és 1925 között 1703 betegen, influenza convalescens vérkészítményt kapott egyénekben 21%-os ($p < 0,001$) csökkenést találtak a halálozási esetek arányában [14]. Az utóbbi 2 évtizedben a CP-t sikeres használták a SARS-CoV-1-, a MERS- és a H1N1-pandémia során, kielégítő hatékonysággal és biztonsággal [6]. Mivel a SARS-CoV-1, a MERS és a COVID-19 virológiai és klinikai jellemzői hasonlóak, a CP ígéretes terápiás lehetőség lehet a COVID-19 esetében is. A COVID-19-fertőzésből felépült betegek magas neutralizálóantitest-titerrel ideális donorok a plazmaterápiához. A magas neutralizálóantitest-tartalmú plazma képes eradikálni a vírust a keringésből és a tüdőszövetből. A CP-terápia hatékonyságának legfontosabb tényezője a neutralizálóantitest-titer, melynek szerepére számos kínai közlemény hivatkozik [9]. 2020. március 24-én az USA Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) publikálta előírásait a vizsgálat alatt álló CP-alkalmazásról COVID-19 esetén [13]. A vírusneutralizációs vizsgálatok a körülményességük és speciális szakértelemigényük miatt nem alkalmasak nagy áteresztőképességű, tömeges donorplazma vizsgálatra, és széles körben nem is érhetőek el. Ezenkívül a teljes anti-SARS-CoV-2-antitest-titer és a neutralizáló SARS-CoV-2 közötti kapcsolat jelenleg még nem tisztázott [13]. A levett vérplazma kvalitatív és kvantitatív vírusellenes IgG-tartalmának és titerének felmérésére ELISA- és EIA- (enzim-immunoassay) módszereket használunk. Azonban a tünetmentesen vagy csak enyhe tünetekkel átvészelt betegséget követően megfelelő antitesttiter ritkán alakul ki. Továbbá, a súlyosabb tünetekkel lezajlott betegséget követően számíthatunk inkább megfelelő antitesttiter kialakulására, de ilyen esetekben is legalább az esetek egyharmadában alacsony az antitesttiter, és csak rövid ideig, kb. 3-4 hónapig marad fenn. Számos egyéb kérdés is tisztázásra vár. Vajon a teljes immunglobulinszintet vagy immunglobulin-alcsoportokat kell-e vizsgálni, illetve hogy melyik antigén ellen termelődött immunfehérje a legfontosabb a vírus eliminációja szempontjából. A legtöbb módszerrel a 'spike' vagy S-fehérje-ellenes antitest vizsgálható. Az adatok korlátozottak ugyan, de a tünetek kezdetétől számított 8–21 nap között figyelték meg az antitestek megjelenését [13]. A CP-terápia a vérellátó és plazmaferézis-központoknak jelentős infrastrukturális kihívást jelent, a donorkok szervezése, a szűrés, a plazmakészítmény előállítása és a logisztikai követelmények miatt. A CP-kezeléssel kapcsolatban a nem infekciós veszélyek közül a transzfúzióhoz kapcsolódó keringés-túlterhelés (TACO) és a transzfúzióhoz kapcsolódó heveny tüdőszérülés (TRALI)

említhető. Specifikus rizikó lehetne a SARS-CoV-2-fertőzés transzfúziós átvitele. Ez teoretikus, mert soha nem jelentették még a légúti vírusfertőzés transzmisszióját transzfúzióval [3]. Kínában 4995, tünetmentes donáció közül 0,02%-ban találtak SARS-CoV-2-RNS-t [15]. További megfontolást igényel az ún. antitestfüggő erősítés (antibody-dependent enhancement, ADE) létezésének teoretikus rizikója, mely szerint az antitest potenciózza a fertőzést [16]. Mind ez ideig azonban CP adásakor ADE-t nem közöltek SARS-1-, MERS- és az eddig ismert COVID-19-esetekben. A CP-terápia alkalmazásakor a COVID-19-et jellemző CRS-ben felmerül egy további kérdés, melyet a hematológiai gyakorlat válaszolhat meg. Ha allogén haploidentikus összejt transzplantáció esetén CRS alakul ki, akkor 48–62 órát kell áthidalnunk, mert alkalmazásra kerül a nagy dózisu ciklofoszfamid, majd a takrolimus- és mikofenolat-mofetil-immunsuppresszió, amely végleg lehűti a CRS-t. Ennek megfelelően a COVID-19 okozta CRS alternatívájaként, ha tocilizumabot, IVIG-et vagy CP-t alkalmazunk, akkor racionális érv a konszolidatív terápia alkalmazása, melynek a legkézenfekvőbb jelöltje lehet a jelátviteli mechanizmust gátló JAK/STAT-gátló alkalmazása [4]. A fentiek alapján megfontolandó terápiás alternatíva lehet a CP alkalmazását követően a JAK/STAT-gátló ruxolitinib vagy baricitinib konszolidációs kezelés alkalmazása.

Következtetés

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a CP-kezelés hatékony terápiás stratégia a súlyos és kritikus állapotú betegek kezelésében. Az általunk kezelt betegeknel az IL6-szint viselkedése változó volt, de a CP beadását követően az első betegnel átmenetileg emelkedett, a második betegben lényegesen nem változott a szint. Az idézett közlemények egyikében sem számoltak be súlyos vagy halált okozó szövödmények jelentkezéséről. A CP alkalmazása hatékonyan adálozza meg a kritikus állapotba való progressziót, illetve a már kritikus állapotba került betegeknel a gépi lélegeztetés megszüntetését is lehetővé tette. Saját tapasztalataink és a szakirodalmi adatok feldolgozása egyaránt arra hívja fel a figyelmet, hogy a CP-kezelést minél előbb kell alkalmazni, lehetőleg az első tünetek megjelenésétől számított 14 napon belül. A gyors állapotromlás időszakára esik a CRS első szakasza, amikor a gyors beavatkozás (CP, IL6-ellenes antitest, JAK/STAT-gátlás) gátat szabhat a citokinvihar kiteljesedésének és a halálos szervi károsodások kialakulásának. A rendelkezésre álló adatok alátámasztják a CP-terápia hatékonyságát és biztonságosságát a súlyos és kritikus COVID-19-fertőzött betegek kezelésére. További lehetőség a CP-terápia hatékonyságának konszolidálása az ún. JAK/STAT-jelátvitelt gátló kezelés által.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása támogatás nélkül történt.

Szerzői munkamegosztás: B. I. és G. L. azonos mértékben járult hozzá a közlemény elkészítéséhez. B. I.: Adatgyűjtés, irodalomkutatás, részvétel a beteg kezelésében, a kézirat megírása, szerkesztése. G. L.: Adatgyűjtés, irodalomkutatás, a kézirat megírása, szerkesztése. R. M., L. B.: Adatgyűjtés, részvétel a beteg kezelésében, a kézirat elkészítésében. B. G., R. P.: Részvétel a kézirat elkészítésében. H. L., M. E.: Részvétel a beteg kezelésében, a kézirat elkészítésében. N. S.: Adatgyűjtés, részvétel a donorok szervezésében, kivizsgálásában, a plazmakészítmény feldolgozásában, a kézirat elkészítésében. S. G.: Részvétel a beteg kezelésében, a kézirat elkészítésében. S. J., Sz. J.: Adatgyűjtés, részvétel a kézirat elkészítésében. Sz. M.: Részvétel a donorok szervezésében, kivizsgálásában, a plazmakészítmény feldolgozásában, a kézirat elkészítésében. V.-N. I.: A kutatási konzorcium vezetője, részvétel a kézirat elkészítésében és javításában. A cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdeklőségek: A szerzőknek nincsenek a közleménnyel összefüggő érdeklőségeik.

Irodalom

- [1] Váradi A, Ferenci T, Falus A. The coronavirus-induced COVID-19 pandemic. Previous experiences and scientific evidences at the end of March, 2020. [A koronavírus okozta COVID-19-pandémia. Korábbi tapasztalatok és tudományos evidenciák 2020. március végén.] *Orv Hetil.* 2020; 161: 644–651. [Hungarian]
- [2] Zhang C, Wu Z, Li JW, et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe COVID-19 and interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist tocilizumab may be the key to reduce the mortality. *Int Antimicrobiol Agents* 2020 Mar 29: 105954. Doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105954. [Epub ahead of print]
- [3] Zhang W, Zhao Y, Zhang F, et al. The use of anti-inflammatory drugs in the treatment of people with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): the experience of clinical immunologists from China. *Clin Immunol.* 2020; 214: 108393. Doi: 10.1016/j.clim.2020.108393.
- [4] Lakatos B, Gopcsa L, Gondos E, et al. Anti-cytokine therapy in novel coronavirus disease (COVID-19) – the first administration of tocilizumab in Hungary at a department of infectology. [Citokinellenes terápia az új típusú koronavírus okozta megbetegedés (COVID-19) kezelésében – tocilizumab elsőként való alkalmazása az infektológiai osztályon.] *Orv Hetil.* 2020; 161: 1071–1078. [Hungarian]
- [5] Mair-Jenkins J, Saavedra-Campos M, Baillie JK, et al. The effectiveness of convalescent plasma and hyperimmune immunoglobulin for the treatment of severe acute respiratory infections of viral etiology: a systematic review and exploratory meta-analysis. *J Infect Dis.* 2015; 211: 80–90.
- [6] Hung IF, To KK, Lee CK, et al. Convalescent plasma treatment reduced mortality in patients with severe pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus infection. *Clin Infect Dis.* 2011; 52: 447–456.
- [7] Fülesdi B, Sárkány P, Szentkereszty Z, et al. Challenges of intensive care and anesthesiology related to COVID-19 pandemic. Practical considerations. [Az aneszteziológiai és intenzív ellátás kihívásai a COVID-19-fertőzéssel kapcsolatban. Gyakorlati ajánlás.] *Orv Hetil.* 2020; 161: 652–659. [Hungarian]
- [8] Gattinoni L, Chiumello D, Caironi P, et al. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for different phenotypes? *Int Care Med.* 2020 Apr 14. Doi:10.1007/s00134-020-06033-2. [Epub ahead of print]
- [9] Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. Treatment of 5 critically ill patients with COVID-19 with convalescent plasma. *JAMA* 2020; 323: 1582–1589.
- [10] Ahn JY, Sohn Y, Lee SH, et al. Use of convalescent plasma therapy in two COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome in Korea. *J Korean Med Sci.* 2020; 35: e149.
- [11] Duan K, Liu B, Li C, et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. *Proc Natl Acad Sci USA* 2020; 117: 9490–9496.
- [12] Ye M, Fu D, Ren Y, et al. Treatment with convalescent plasma for COVID-19 patients in Wuhan, China. *J Med Virol.* 2020 Apr 15. Doi: 10.1002/jmv.25882. [Epub ahead of print]
- [13] Bloch EM, Shoham S, Casadevall A, et al. Deployment of convalescent plasma for the prevention and treatment of COVID-19. *J Clin Invest.* 2020 Apr 7. Doi: 10.1172/JCI138745. [Epub ahead of print]
- [14] Luke TC, Kilbane EM, Jackson JL, et al. Meta-analysis: convalescent blood products for Spanish influenza pneumonia: a future H5N1 treatment? *Ann Intern Med.* 2006; 145: 599–609.
- [15] Chang L, Zhao L, Gong H. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 RNA detected in blood donations. *Emerg Infect Dis.* 2020; 26(7). Doi: 10.3201/eid2607.200839.
- [16] Fleming AB, Raabe V. Current studies of convalescent plasma therapy for COVID-19 may underestimate risk of antibody-dependent enhancement. *J Clin Virol.* 2020; 127: 104388. Doi: 10.1016/j.jcv.2020.104388.

(Gopcsa László dr.,
Budapest, Albert Flórián út 5–7., 1097
e-mail: laszlogopcsa@yahoo.com)