Súlyos hypoxaemia légszomj nélkül COVID-19-pneumoniában

Losonczy György dr.¹ ■ Lukácsovits József dr.¹ ■ Süttő Zoltán dr.¹
Lorx András dr.² ■ Müller Veronika dr.¹

¹Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pulmonológiai Klinika, Budapest

²Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest

Számos közlemény született arról, hogy a COVID-19-pneumoniás betegek jelentős hányadában az artériás parciális oxigéntenzio kifejezetten alacsony, mégsem jellemző a dyspnoe, és a pulzusoximetria sem mutat – a csökkent oxigéntenzióval arányos – súlyos hypoxaemiát. A jelenséget „happy hypoxaemia” néven említik. Ugyanakkor a légszomjról nem panaszkodó, de súlyos alveolocapillaris O₂-felvételi zavarban szenvedő COVID-19-pneumoniás betegek a legkisebb fizikai megterhelést sem tűrik, és állapotuk gyorsan kritikussá válhat, tehát a hypoxaemia mértékének időben való felismerése kulcskérdés. A jelen közleményben egy ilyen eset rövid ismertetése után összefoglaljuk a súlyos, de tünetmentes hypoxaemia hátterében meghúzódó élettani okokat. Ezek között szerepel a hypocapnia (respiratoricus alkalosis) is, mely alacsony oxigéntenzio mellett is a hemoglobín viszonylag megtartott oxigénszaturációját eredményezi. Ezért a mindennapi COVID-19-ellátásban a megismételt artériásvég-gáz-meghatározások jelentősége nem hangsúlyozható eléggé.

Orv Hetil. 2021; 162(10): 362–365.

Kulcsszavak: koronavírus, tüdőgyulladás, hypocapnia, oxigénaffinitás

Severe hypoxaemia without dyspnoe in COVID-19 pneumonia

Many COVID-19 patients have very low arterial partial oxygen tension while severe dyspnoe does not develop. Pulse oxymetry indicates only moderate reduction of arterial O₂ saturation in these patients. The phenomenon is named “happy hypoxaemia”. Lack of (severe) dyspnoe and only moderately decreased O₂ saturation in severely impaired alveolo-capillary O₂ uptake may partially be explained by an increased oxygen affinity of hemoglobin in the presence of low arterial partial pressure of CO₂. The latter results from increased alveolar ventilation, while low partial pressure of O₂ in COVID-19 patients reflects right-to-left shunting of pulmonary blood flow and ventilation-perfusion mismatch of the diseased lungs. While such patients may have mild complaints as related to the real impairment of alveolo-capillary oxygen exchange, severe hypoxaemia is a negative prognostic factor of outcome in this state where severe clinical deterioration may rapidly appear. The latter circumstance together with the unusual relationship of O₂ partial pressure and O₂ saturation of hemoglobin in COVID-19 emphasize the importance of repeated complete arterial blood gas analyses in these patients.

Keywords: coronavirus, lung infection, hypocapnia, oxygen affinity

Losonczy Gy, Lukácsovits J, Süttő Z, Lorx A, Müller V. [Severe hypoxaemia without dyspnoe in COVID-19 pneumonia]. Orv Hetil. 2021; 162(10): 362–365.

(Beérkezett: 2020. december 10.; elfogadva: 2021. január 16.)

Rövidítések

cHCO₃ = plazmabikarbonát-koncentráció; COVID-19 = (coronavirus disease 2019) koronavírus-betegség 2019; CRP = C-reaktív protein; CT = (computed tomography) számítógépes tomográfia; FiO₂ = (fraction of inspired oxygen) a belélegzett oxigén frakciója; Hb = hemoglobín; IL6 = interleukin-6;

p50 = 50%-os Hb-szaturációt biztosító pO₂; PaCO₂ = artériás parciális szén-dioxid-tenzio; PaO₂ = artériás parciális oxigéntenzio; pCO₂ = parciális szén-dioxid-tenzio; PCV = (pressure controlled ventilation) nyomáskontrollált lélegeztetés; PEEP = (positive end-expiratory pressure) pozitív végkilégzéses nyomás; pH = a vegyhatás értéke; pO₂ = parciális oxigéntenzio;

RT-PCR = (real-time polymerase chain reaction) valós idejű polimeráz-láncreakció; SaO_2 = oxigénszaturáció; SARS-CoV-2 = (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus-2; SpO_2 = pulzus-oximetriával mért oxigénszaturáció

Esetismertetés

A 75 éves asszonyt idősek otthonából mentő szállította a Pulmonológiai Klinikára napok óta tartó köhögés, nyugalomban nem jelentkező, de terhelésre fellépő fulladás miatt. Anamnézisében lényeges maradványtünet nélkül lezajlott stroke szerepel. Mellkasi CT-képén a tüdőparenchyma kb. 60%-át érintő, COVID-19-re jellemző infiltráció látszott (1. ábra). Laboratóriumi eredményei közül: lymphocytopenia, CRP, IL6, ferritin és d-dimer jelentősen fokozott, procalcitonin a referenciatartományban. SARS-CoV-2-kimutatás RT-PCR-módszerrel garatváladékban: pozitív. Artériás parciális oxigéntenziója (PaO_2) kezdetben 83 Hgmm volt, 15 l/perc O_2 - (arcmaszkon) adagolás mellett ($\text{PaCO}_2 = 40$ Hgmm, $\text{cHCO}_3 = 27,9$ mmol/l, $\text{pH} = 7,465$). Remdesivir-, azitromicin- és dexametazonkezelést, C-vitamin- és D-vitamin-pótlást, valamint ulcus- és thrombosisprofilaxist alkalmaztunk. Egy nap múlva hypoxaemiája sokat romlott: a PaO_2 35 Hgmm volt (15 l/perc O_2 -adagolás mellett, továbbra is arcmaszok segítségével), amit a beteg igen kevéssé élt meg. A PaCO_2 35 Hgmm, a cHCO_3 27,0 mmol/l, a pH 7,508, az SaO_2 90% volt. További ellátás céljából a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájára helyeztük át. Az 50%-os hemoglobin (Hb)-szaturációt biztosító pO_2 (p50) 19,7–20,8 Hgmm között mozgott, ami a Hb O_2 iránti affinitásának fokozódását jelezte (fiziológias p50: 26 Hgmm). Az első 24 órában noninvazív ventiláció történt (70% FiO_2 -vel, 19 l/min perclégzés), majd a rákövetkező na-

pon a légzőizom-kifáradás jelei és a romló oxigenizálhatóság miatt invazív gépi lélegeztetés indult (PCV-PEEP 12 H_2Ocm , 14 H_2Ocm nyomáshurok, 50% FiO_2 Horowitz: 170 körül). A beteg rekonvaleszcens plazmával, remdesivirrel és dexametazonnal való kezelése folytatódott, keringéstámogatással. Oxigenizációja a 7. napon romlott, a keringéstámogatási igény fokozódott, majd progresszív állapotromlás, metabolikus acidózis és keringési-légzési elégtelenség tünetei között a beteg a 10. napon exitált.

Megbeszélés

A COVID-19-pneumonia lefolyása az esetek 81%-ában enyhe, 14%-ában súlyos és mintegy 5%-ában kritikusan súlyos [1]. Sok betegnek igen alacsony az artériás parciális oxigéntenziója ($\text{PaO}_2 = 30\text{--}40$ Hgmm), és mégsem panaszkodnak légszomjra [2–4]. Ezt nevezték az első leírók „happy hypoxaemiá”-nak [5–7]. Saját tapasztalataink szerint gyakori, hogy nyugalomban a COVID-betegek nem panaszkodnak fulladásról még súlyos hypoxaemia mellett sem, de a legkisebb terhelésre is (például néhány méter séta a kórteremben) súlyos légszomj, sőt syncope alakulhat ki. Közismert, hogy a COVID-19-pneumonia gyorsan megy át életveszélyes állapotba. Igazolódott, hogy a súlyos hypoxaemia az intenzív osztályos felvétel és a kórházi halálozás szempontjából független prognosztikus tényező [8]. Az alveolocapillaris O_2 -felvételi zavar valós mértékének felismerése tehát fontos, ezért érdemesnek látszik röviden áttekinteni, hogy milyen okok magyarázhatják a dyspnoe felléptének elmaradását súlyos hypoxaemiában.

Az ismertetett esetben a 35 Hgmm-es PaO_2 nem vezetett dyspnoéhoz, igaz, az SaO_2 90%-os volt. A Hb fiziológias O_2 -affinitása (p50 = 26 Hgmm) mellett 35 Hgmm-es PaO_2 esetében 70% körüli SaO_2 volna mér-

1. ábra | Hetvenöt éves asszony COVID-19-pneumóniájának CT-képe

2. ábra | Az alveoláris parciális oxigénnyomás (PaO_2) és a ventiláció összefüggése ([12] irodalom alapján)

hető. A dyspnoe elmaradása mellett tehát a beteg SaO_2 -je is a valószínűleg messze jobb alveolocapillaris oxigenizációt sejtetett. A dyspnoe kényelmetlen, nehéz vagy fárasztó légzést jelent. Legerősebb ingere az akut hypercapnia [9], de kiválthatják – más afferens ingerek mellett – a tüdő feszítési receptorai is. Akut hypercapnia hatására fokozódik a periventiláció. Az akut hypercapniával szemben a hypoxaemia csak gyenge inger a légzőszomj kialakulásában [10]. Ha például – változatlan PaCO_2 mellett – a PaO_2 95 Hgmm-ről 65 Hgmm-re csökken, a kialakuló dyspnoe csak minimális mértékű [10, 11]. Hypoxaemiára a szervezet a légzési térfogat (hyperpnoe) és a légzési frekvencia (tachypnoe) fokozásával válaszol, vagyis a hypoxaemiára adott élettani válasz a hyperventiláció, nem feltétlenül a dyspnoe (2. ábra) [12]. Az ismertetett esetben sem igazolódott hypercapnia, sőt a pH alkalikus irányban tolódott el ($\text{pH} = 7,51$). A vérgázváltozásokat illetően tehát erős dyspnoeinger nem állt fenn.

A „happy hypoxaemia” okai COVID-19-pneumoniában

Egy több mint 1000 beteg kórlefolását elemző közleményben arról számoltak be, hogy a betegeknek csak a 18,7%-a volt dyspnoés annak ellenére, hogy a $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ arány (alveolocapillaris O_2 -felvétel) szinte kivétel nélkül mindenkinben jelentősen csökkent (430 felettiről <300-ra); a betegek 86%-ában kóros volt a CT-lelet is (pneumonia), és 41%-uk O_2 -terápiát is igényelt [13, 14]. Nyugalomban dyspnoe nélküli súlyos hypoxaemia előfordulhat pulmonalis arteriovenosus malformatiókban (intrapulmonalis jobb-bal sönt) vagy intracardialis jobb-bal sönt keringést okozó vitiumokban [15]. Ezen állapotokban közös, hogy a PaO_2 csökkenése a PaCO_2 egyidejű változása nélkül (vagy csökkenése mellett) alakul ki, és a tüdő tágulékonyasága is többé-kevésbé megtartott, a különféle mellkasfali és pulmonalis feszítési receptorok nem aktiválódnak. Gattinoni és mtsai [6] számoltak be

3. ábra | Hypocapniában (alkalosisban) fokozódik a hemoglobin affinitása O_2 iránt. Súlyos hypoxaemiában (pl. 35 Hgmm) közel 80%-os SaO_2 mérhető. Normocapnia mellett ilyenkor az SaO_2 közel 50%-ra csökkenne ([17] irodalom alapján)

arról, hogy a COVID-19-fertőzést követő kiterjedt pneumoniában is gyakran közel fiziológiás marad a tüdő tágulékonyasága, miközben az alveolocapillaris rendszerben rohamszerűen gyors és a jobb-bal sönt keringés arányát fokozó angiogenezis zajlik [16]. Az oxihemoglobindisszociációs görbe lefutásának változásai COVID-19-pneumoniában az artériás hypoxaemia hatására fellépő alveolaris hiperventiláció miatt csökken a PaCO_2 . Hypocapniában [3] a Hb O_2 iránti affinitása fokozódik (3. ábra) [17], tehát minden adott PaO_2 -értékhez magasabb SaO_2 -érték tartozik, mint normocapnia mellett. Ez részben megmagyarázza, hogy COVID-19-ben miért jár viszonylag elfogadható SaO_2 -vel a súlyos, életveszélyesen alacsony PaO_2 [7, 18]. A 4. ábra érzékelteti, hogy adott PaO_2 (az ábrán 50 Hgmm) mellett a csökkenő PaCO_2 önmagában elegendő az SaO_2 emelkedéséhez. Ha a PaCO_2 például 22 Hgmm, az 50 Hgmm-es PaO_2 közel 90%-os SaO_2 -vel jár együtt, bár 40 Hgmm-es (élettani) PaCO_2 mellett az SaO_2 80% alatt maradna. Az alacsonyabb p50 mellett jobb szaturáció kedvez az oxigénfelvételnek a beteg tüdőben, hiszen kisebb parciális nyomás mellett több oxigén kötődik meg, így adott Hb-koncentráció és keringési perctérfogat mellett emelkedhet az oxigénszállítás a szövetek felé. Az alacsony p50 azonban a periférián sem kedvez az oxigénleadásnak, a capillaris vér parciális O_2 -tenziója is jelentősen csökken. Következésképpen csökken a capillaris O_2 -sejt- O_2 gradiens, és a szöveti O_2 -fluxus alacsonyabb. Részben ez magyarázza a viszonylag megtartott O_2 -szaturáció mellett alacsony teherbírást. Az SaO_2 -mérések – nem beszélve az SpO_2 (pulzusoximetria)-mérésekről – eredménye tehát csak a fennálló hiperventiláció (tachypnoe, hyperpnoe, alacsony PaCO_2 , pH) tükrében értékelhető. Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy ha csak lehet, a beteg oxigénellátottságát célszerű ismételt artériásvérgáz-meghatározásokkal (PaO_2 , PaCO_2 , pH) ellenőrizni.

A súlyosan hypoxaemiás COVID-19-pneumóniásokban elmaradó légzőszomj okaként a hypocapnia mellett említeneek más mechanizmusokat is. A szaglás- és az ízér-

4. ábra | A PaCO_2 és az SaO_2 közötti inverz összefüggés vérben, magaslati körülmények között, körülbelül fél atmoszféras légköri nyomáson ([7] irodalom alapján)

zés jellegzetes kiesése az ingereket közvetítő neuralis struktúrák vírusos gyulladásával függ össze. Ugyanezt igazolták a nervus glossopharyngeusszal és a glomus caroticummal kapcsolatban is [19]; az utóbbi struktúráknak lényeges szerep jut a légzőközpont afferentációjában. Elmaradhat a tüdő feszítési receptorainak kóros ingerülete is, mivel COVID-19-pneumóniában – az esetek mintegy felében – a megbetegedett tüdő tágulékony-sága (compliance) alig csökken [6, 13], szemben a „klasszikus” felnőttkori respirációs distressz szindrómával, melyben a tüdőtaulékony-ság rendszerint kórosan alacsony. Tekintettel az alacsony PaO_2 -értékre és a súlyosan csökkent diffúziós kapacitásra, COVID-19-pneumóniában a minimális terhelés is gyors további deszaturációt idéz elő, így a betegek minimális mozgása, terhelése vagy akár egy belázasodás kritikus oxigénhiányos állapothoz vezethet, ami akár fatális lehet. Miután a beteg nem feltétlenül érzi a hypoxiát, a kezelőorvosnak szükséges erre odafigyelnie, esetleg a beteg mozgásának korlátozásával is (például nem mehet ki a WC-re). Ezt szem előtt kell tartani a betegek kezelése során.

Anyagi támogatás: A szerzők anyagi támogatásban nem részesültek.

Szerzői munkamegosztás: L. Gy. kezdeményezte a kézirat megírását és írta az eredeti kéziratot. L. J. gyakorlati és intenzív terápiás tapasztalatokkal és a szöveg javításával járult hozzá a kézirathoz. S. Z. volt a beteg kezelő szakorvosa, és pulmonológiai tapasztalatokkal támogatta a kézirat létrejöttét. L. A. intenzív terápiás tapasztalatokkal és a szöveg javításával járult hozzá a kézirathoz. M. V. kezdeményezte L. Gy.-gyel együtt a kézirat létrejöttét és javította a szöveget. A cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.

Irodalom

- [1] Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; 323: 1239–1242.
- [2] Xie J, Tong Z, Guan X, et al. Critical care crisis and some recommendations during the COVID-19 epidemic in China. Intensive Care Med. 2020; 46: 837–840.
- [3] Tobin MJ, Laghi F, Jubran A. Why COVID-19 silent hypoxemia is baffling to physicians. Am J Respir Crit Care Med. 2020; 2020: 356–360.
- [4] Wilkerson RG, Adler JD, Shah NG, et al. Silent hypoxia: a harbinger of clinical deterioration in patients with COVID-19. Am J Emerg Med. 2020; 38: 2243.e5–2243.e6.
- [5] Ottestad W, Seim M, Maehlen JO. COVID-19 with silent hypoxemia. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Apr 11; 140(7). Doi: 10.4045/tidsskr.20.0299. [English, Norwegian]
- [6] Gattinoni L, Coppola S, Cressoni M, et al. COVID-19 does not lead to a “typical” acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2020; 201: 1299–1300.
- [7] Ottestad W, Søvik S. COVID-19 patients with respiratory failure: what can we learn from aviation medicine? Br J Anaesthesia 2020; 125: e280–e281.
- [8] Xie J, Covassin N, Fan Z, et al. Association between hypoxemia and mortality in patients with COVID-19. Mayo Clin Proc. 2020; 95: 1138–1147.
- [9] Vaporidi K, Akoumianaki E, Telias I, et al. Respiratory drive in critically ill patients. Pathophysiology and clinical implications. Am J Respir Crit Care Med. 2020; 201: 20–32.
- [10] Manning HL, Schwartzstein RM. Pathophysiology of dyspnea. N Engl J Med. 1995; 333: 1547–1553.
- [11] Easton PA, Slykerman LJ, Anthonisen NR. Ventilatory response to sustained hypoxia in normal adults. J Appl Physiol. 1986; 61: 906–911.
- [12] Weil JV, Byrne-Quinn E, Sodal IE, et al. Hypoxic ventilatory drive in normal man. J Clin Invest. 1970; 49: 1061–1072.
- [13] Gattinoni L, Chiumello D, Caironi P, et al. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for different phenotypes. Intensive Care Med. 2020; 46: 1099–1102.
- [14] Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Eng J Med. 2020; 382: 1708–1720.
- [15] Dhont S, Derom E, Van Braeckel E, et al. The pathophysiology of “happy” hypoxemia in COVID-19. Respir Res. 2020; 21: 198.
- [16] Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M, et al. Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in COVID-19. N Engl J Med. 2020; 383: 120–128.
- [17] Kelman GR, Nunn JF. Nomograms for correction of blood PO_2 , PCO_2 , pH, and base excess for time and temperature. J Appl Physiol. 1966; 21: 1484–1490.
- [18] Woyke S, Rauch S, Ströhle M, et al. Modulation of Hb- O_2 affinity to improve hypoxemia in COVID-19 patients. Clin Nutr. 2021; 40: 38–39.
- [19] Divani AA, Andalib S, Biller J, et al. Central nervous system manifestations associated with COVID-19. Curr Neurol Neurosci Rep. 2020; 20: 60.

(Losonczy György dr.,
Budapest, Tömő u. 25–29., 1083
e-mail: losonczygyrgy@gmail.com)